

Алзан®

Для устранения седативного действия медетомидина и дексмедетомидина у собак и кошек

(организация-разработчик: «Laboratorious SYVA S.A.U.», Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Алзан (Alzane)
Международное непатентованное наименование: Атипамезола гидрохлорид.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Алзан содержит в 1 мл в качестве действующего вещества Атипамезола гидрохлорид – 5 мг, а в качестве вспомогательных веществ – Метилпарагидроксибензоат (Е 218) – 1мг, натрия хлорид и воду для инъекций – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор.
3. Препарат расфасован по 10 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы в индивидуальные картонные коробки. В каждую коробку с препаратом вкладывают инструкцию по его применению.
4. Алзан хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре не выше 25°C.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения составляет 2 года с даты производства. После отбора из флакона части препарата, при условии соблюдения правил асептики и указанных условий хранения, его можно использовать многократно, в течение 28 дней. Запрещается применять препарат после истечения срока годности.
5. Препарат хранят в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Алзан относится к группе $\alpha 2$ –антагонистов.
Атипамезола гидрохлорид – действующее вещество Алзана – избирательно блокирует $\alpha 2$ -рецепторы ($\alpha 2$ -антагонист), что вызывает выброс норадреналина в центральной и периферической нервной системе. Это приводит к стимулированию

симпатической нервной системы, в результате чего устраняется действие медетомидина гидрохлорида (Дорбена), активизирующего $\alpha 2$ -рецепторы.
Алзан быстро всасывается после внутримышечного введения и через 10-15 минут достигает максимальной концентрации в крови. Атипамезола гидрохлорид окисляется, метаболизируется в печени малая часть метаболизируется в почках, выделяется главным образом с мочой.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Алзан применяют для устранения седативного и анальгезирующего действия медетомидина гидрохлорида (торговое название - Дорбен) и дексмедетомидина у собак и кошек, а также при необходимости устранения побочного действия медетомидина или дексмедетомидина на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
9. Препарат не применяют беременным и лактирующим животным, а также для устранения действия других седативных средств. Запрещается применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, а также животным с заболеваниями печени, почек или сердца.
10. Препарат вводят внутримышечно однократно через 15-60 минут после введения медетомидина или дексмедетомидина. Обычно седативное действие снимается в течение 5-10 мин.
В случае продолжающегося угнетённого состояния у животного, возможно повторное введение Алзана для устранения действия медетомидина или дексмедетомидина, через 10-15 минут после первого введения в следующих дозах:
-для собак доза Алзана в мл равна дозе Дорбена или Дексдомитора в мл (доза)
-для кошек доза Алзана в мл равна половине введённой дозы Дорбена или Дексдомитора

Вид	Доза Дорбена	Доза Дексдомитора	Доза Алзана
Собаки	0,4 мл/10 кг	0,4 мл/10 кг	0,4 мл/10 кг
Кошки	0,4 мл/5 кг	0,4 мл/5 кг	0,2 мл/5 кг

11. Передозировка атипамезола гидрохлорида может приводить к развитию транзиторной тахикардии и возбуждению (гиперактивности, мышечному тремору). При необходимости возможно купирование данных симптомов введением медетомидина или дексмедетомидина гидрохлорида в дозе, меньшей, чем обычно используется в клинической практике. При случайном введении атипамезола гидрохлорида животным, ранее не получавшим медетомидина или дексмедетомидина гидрохлорид, возможно также развитие гиперактивности и

мышечного тремора, которые могут сохраняться в течение приблизительно 15 минут.

12. Особенности действия при начале введения и отмене препарата не выявлено.

13. Препарат предназначен для однократного введения.

14. В течение первых 10 минут после введения атипамезола гидрохлорида отмечалось развитие транзиторного гипотензивного эффекта.

В редких случаях регистрировались гиперактивность, тахикардия, слюнотечение, атипичная вокализация, мышечный тремор, рвота, повышение частоты дыхательных движений, неконтролируемое мочеиспускание и дефекация. В очень редких случаях возможно развитие рецидива седации; кроме того, в очень редких случаях атипамезол может не приводить к укорочению времени восстановления.

У кошек при введении препарата в низкой дозе с целью частичного купирования эффекта медетомидина или дексмедетомидина возможно развитие гипотермии (даже после разрешения седации).

15. Не рекомендуется одновременное введение атипамезола с другими лекарственными средствами центрального действия, такими как диазепам, ацепромазин и опиаты.

16. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Алзана следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.