

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Айнила 1% для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата и в качестве обезболивающего и жаропонижающего
средства у собак и кошек

(организация-разработчик компания «INDUSTRIAL VETERINARIA S.A.» (INVESA),
C/Esmeralda, 19, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Айнил 1% (Ainil 1%).

Международное непатентованное наименование: кетопрофен.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Айнил 1% в 1 мл содержит в качестве действующего вещества кетопрофен – 10 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензиловый спирт – 10 мг, аргинин – 70 мг, моногидрат лимонной кислоты (в количестве, необходимым для коррекции рН 6,3 – 7,7) и воду для инъекции – до 1 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветный прозрачный раствор.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 7 суток. Запрещается применять Айнил 1% по истечении срока годности.

4. Выпускают Айнил 1% расфасованным по 10, 20, 50, 100 и 250 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, поштучно помещенные в картонные коробки.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °C до 25 °C.

6. Айнил 1% следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Фармакологическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: нестероидный противовоспалительный лекарственный препарат.

10. Кетопрофен, входящий в состав препарата, является производным пропионовой кислоты, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, подавляет агрегацию тромбоцитов. Механизм действия кетопрофена основан на подавлении синтеза простагландинов в результате воздействия на циклооксигеназное и липооксигеназное звено метаболизма арахидоновой кислоты,

стабилизирует лизосомальные мембранны, вызывает угнетение активности нейтрофилов у животных больных артритом.

Кетопрофен быстро всасывается из места инъекции, поступает в кровь и большинство органов и тканей. Максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови после внутримышечного введения собакам отмечается через 7-10 минут, после подкожного - через 30-35 минут, после подкожного введения кошкам - через 15-20 минут. Выводится препарат из организма преимущественно с мочой.

Айнил 1% по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего и эмбриотоксического действия, не кумулируется в организме.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Айнил 1% назначают для лечения воспалительных процессов при острых и обострении хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, тендовагиниты, травмы), болевого синдрома различной этиологии (травматическая и послеоперационная боль, колики), а также в качестве жаропонижающего средства у собак и кошек.

12. Противопоказанием к применению Айнила 1% является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрагический синдром, выраженная почечная недостаточность.

13. Препарат вводят животным в следующих дозах:

– собакам подкожно, внутривенно или внутримышечно 0,2 мл на 1 кг массы тела животного (эквивалентно 2 мг кетопрофена на кг массы тела животного) в сутки ежедневно в течение 1 – 3 дней;

– кошкам подкожно 0,2 мл на 1 кг массы тела животного (эквивалентно 2 мг кетопрофена на кг массы животного) в сутки ежедневно в течение 1 – 3 дней. Перед каждым использованием флакон с препаратом следует тщательно встряхнуть.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, воспалительная реакция в месте инъекций, появление язв в желудке и 12-перстной кишке. В этом случае прекращают применение препарата, животному назначают средства симптоматической терапии.

15. С осторожностью применять лекарственный препарат животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии вследствие возможного токсического влияния кетопрофена на почки.

16. Не применять лекарственный препарат во время беременности.

17. При пропуске очередной дозы курс применения препарата необходимо как можно скорее возобновить в той же дозе и схеме применения.

18. У некоторых животных после применения препарата может возникать раздражение слизистой желудка и рвота. Указанные симптомы исчезают самопроизвольно, и обычно не требует дополнительного применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного его применение прекращают и назначают симптоматическое лечение.

19. Не следует применять Айнил 1% одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами, диуретиками и антикоагулянтами.

20. Айнил 1% не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с Айнилом 1% следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

22. Людям с гиперчувствительностью к нестероидным противовоспалительным средствам следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом. Избегать попадания препарата на кожу или в глаза.

23. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой, при попадании внутрь или проявлении аллергической реакции следует немедленно обратиться в медицинское учреждение, имея при себе инструкцию по применению или этикетку.

Наименование и адрес производственной площадки производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.»
(INVESA), C/Esmralda, 19, 08950,
Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain/
«ИНДАСТРИАЛ ВЕТЕРИНАРИА
С.А.» (ИНВЕСА) С/Эсмеральда, 19,
08950, Эсплугес де Лобрегат, Барселона,
Испания;

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «ЛИРУС»
115093 ул. Большая Серпуховская д. 31,
корп.12.

С согласованием настоящей Инструкции, утрачивает силу Инструкция по применению Айнила 1%, утвержденная Россельхознадзором 20 июня 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения: 724-3-4.14-2018 №ПВИ-3-4.8/02422