

УТВЕРЖДАЮ  
Ч.а. Председатель Комитета  
Ветеринарного Контроля и  
Надзора МСХ РК

*Кадынгалиев Т.А.*  
*Надзор*  
« 020 02 2017 г.

### Наставление

на применению Гепасейфа плюс для лечения и профилактики заболеваний печени у собак и кошек

(организация-разработчик: ТОО «ВетЗашитаАзия», г. Костанай)

#### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Гепасейф плюс(Gepasafeplus). Международные непатентованные наименования: силибинин, токоферол, метионин.
2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения. Гепасейф плюс в качестве действующих веществ в 1мл содержит силимарин - 40 мг, витамин Е- 5 мг, метионин - 4 мг и вспомогательные вещества лактулозу – 20мг и воду дистilledную до 1 мл.

По внешнему виду Гепасейф плюс представляет собой суспензию, коричневого цвета с характерным запахом. Допускается образование осадка при хранении.

3. Лекарственный препарат выпускают расфасованным в стеклянные флаконы 50, 200, 250 мл; в полимерные флаконы по50, 100, 200, и 250 мл; в полимерные бутылки 500 и 1000 мл. Флаконы с препаратом индивидуально упаковывают вместе с инструкцией по применению в картонные пачки. В каждую пачку возможно вложение стаканчика и (или) одноразового шприца. Допускается упаковка флаконов без пакета в картонную пачку.

4. Гепасейф плюс хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года для производства. После первого вскрытия лекарственный препарат можно использовать в течение 30 суток.

Гепасейф плюс запрещается применять по истечении срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

#### II. Фармакологические свойства

7. Гепасейф плюс относится к гепатопротекторным препаратам. Входящие в состав препарата Гепасейф плюс действующие вещества улучшают функциональное состояние печени, способствуют защите и восстановлению структуры гепатоцитов; нормализуют выведение аммиака и ускоряют регенерацию клеток печени.

Силимарин оказывает регенерирующее, гепатопротекторное, дезинтоксикационное действие, защищает ткани печени при различных токсических поражениях, способствует восстановлению функции и структуры клеток печени.

Витамин Е тормозит развитие свободнорадикальных реакций, предупреждает разование перекисей, повреждающих клеточные и субклеточные мембранны.

Метионин представляет собой незаменимую для организма аминокислоту. Обладает опротекторным действием. Активирует действие гормонов, витаминов и ферментов. Уменьшает концентрацию холестерина в крови и увеличивает содержание фосфолипидов.

Гепасейф плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

8. Гепасейф плюс назначают собакам и кошкам самостоятельно или в составе комплексной терапии для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний различной этиологии (гепатиты, цирроз печени, дистрофия и жировая дегенерация печени, коррекция нарушений липидного обмена), в том числе инфекционных, паразитарных заболеваний, а также для снижения гепатотоксичного действия некоторых терапевтических лекарственных средств.

9. Запрещается применение лекарственного препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

10. Препарат применяют перорально, индивидуальным способом с помощью шприца-дозатора 2 раза в день в течение 3 недель, в дозах указанных в таблице:

Масса животного	Разовая доза, мл	Суточная доза, мл
Кошки		
до 3 кг	1	2
3 – 6 кг	2	4
от 7 и более	3	6
Собаки		
до 10 кг	2	4
10 – 20 кг	3	6
20 – 30 кг	4	8
30 – 40 кг	5	10
от 40 и более	6	12

При необходимости курс лечения повторяют через 2 – 3 недели. Перед применением препарата рекомендуется взболтать.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не установлены.

12. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении не выявлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. Побочных явлений и осложнений у собак и кошек при применении Гепасейфа в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. В редких случаях (у кошек), при длительном применении лекарственного препарата, может наблюдаться гиперсаливация. В

случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

15. Гепасейф плюс совместим с лекарственными средствами, кормами и кормовыми добавками.

16. Гепасейф плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Гепасейф плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми полочками глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Людям с чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гепасейф плюс. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она не подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Приложение по применению разработано ТОО «ВетЗаштаАзия», г. Костанай

Доктор, .  
ТОО «ВетЗаштаАзия»



Н.А. Полстянкина