

ООО «НЕРОХИМ»

Утвердил:

Директор

ООО «НЕРОХИМ»

Титов С.Г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства
для объектов ветеринарного
надзора по применению
«ОЛДЕЗ/ALLDEZ»
(ООО «НЕРОХИМ», Россия)

Составил:

Дата создания инструкции:

Ярославль 2023

Наименование продукции и производитель:

Наименование: Средство для дезинфекции объектов
ветеринарного надзора
«ОЛДЕЗ/Alldez».

ТУ 20.20.14-015-48162580-2023

Производитель: ООО «НЕРОХИМ»,
152150, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Пролетарская ул, дом № 86
Телефон: +7(4852) 59 30 10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Олдез/Alldez» - средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных. Средство «Олдез/Alldez» представляет собой прозрачную жидкость коричневого цвета, имеющую слабый специфический запах. Легко смешивается с водой в любых соотношениях. Содержит 24,8% четвертичных аммониевых соединений (дидецилдиметиламмоний хлорид - 7,8%, алкилдиметилбензиламмония хлорид - 17,0%) и 10,7% глутарового альдегида в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки; pH 1% водного раствора составляет 3,0-5,0. Средство выпускается в пластмассовых или стеклянных бутылках по 0,5 л, 1 л, или в пластиковых канистрах по 5 л, 10, 20 л, а также по 210 л в металлических бочках. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, с указанием названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объема упаковки, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности, а также снабжают инструкцией по применению. Срок годности средства составляет 3 года при условии хранения в невскрытой упаковке в темном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус 18°C до плюс 35°C. Не замораживать (температура замерзания минус 19°C).

Срок хранения рабочих растворов - не более 14 суток. По истечении срока годности средство не должно применяться.

1.2 Средство обладает антимикробной активностью в отношении вирусов (включая вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома и классической чумы свиней, африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции свиней тип-2), грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая бактерии группы кишечной палочки, микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы бактерий), грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени).

1.3 Средство «Олдез/Alldez» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ и

к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость средство по классификации К.К. Сидорова малотоксично (4 класс опасности; по степени летучести, пары средства в насыщающих концентрациях при однократном ингаляционном воздействии относятся к 3 классу умеренно опасных веществ. Средство оказывает местнораздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаз и обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы «Олдез/Alldez» не портят материалы обрабатываемых поверхностей.

1.4.Средство предназначено для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора:

- для дезинфекции изделий ветеринарного и медицинского назначения (включая инструменты), поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды лабораторной, предметов ухода за больными животными при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитиях в лечебно-профилактических учреждениях (изоляторы, боксы), в животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещениях, для находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов (включая инкубатории, яйцесклады), для молочных блоков и кормокухонь, для санитарно-технического оборудования и санитарных боен, открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), для тары и одежды;
- для производственных помещений, технологического оборудования и территории, предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности;
- в инфекционных очагах и транспорте для перевозки животных и птицы (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт), а также для перевозки сырья и продукции животного происхождения;
- для проведения генеральных уборок в животноводческих помещениях;
- для ветеринарных клиник (станций), лабораторий, вивариев, цирков и зоопарков.
- для дезинфекции спецодежды и обуви обслуживающего персонала

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы «Олде/Alldez», предназначенные для дезинфекции различных объектов, готовят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях путем добавления соответствующего количества средства к питьевой или водопроводной воде с температурой 18-25 0 С. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество (табл.1).

Таблица 1

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства «Олдез/Alldez».

Концентрация (%) раствора по:	Количество ингредиентов (мл) для приготовления
-------------------------------	--

препаратуре	ГА	ЧАС	рабочего раствора объемом			
			1 л	25	10 л	99975
0,25	0,027	0,062	2,5	997,5	25	99975
0,5	0,054	0,124	5	995	50	99950
1,0	0,107	0,248	10	990	100	9900
10	1,07	2,48	100	900	1000	9000
25	2,675	6,2	250	750	2500	7500

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Для профилактической дезинфекции объектов, имеющих гладкую поверхность, методом мелкокапельного орошения, генерирования пены или протирания дезинфицируемых поверхностей применяют водный (рабочий) раствор «Олдез/Alldez» в концентрации 0,25% при норме расхода 0,25 л/м 2 и экспозиции 20 мин.

3.2. Шероховатые поверхности дезинфицируют водным (рабочим) раствором «Олдез/Alldez» в концентрации 0,25% при норме расхода 0,35 л/м 2 и экспозиции 30 мин.

3.3. Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии (включая туберкулез) вышеуказанных объектов, имеющих гладкие или шероховатые поверхности, применяют водный (рабочий) раствор «Олдез/Alldez» в концентрации 0,5% при норме расхода 0,5л/м 2 и экспозиции 1 час методом мелкокапельного орошения, генерирования пены или протирания дезинфицируемых поверхностей.

3.4. Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом аэрозольного распыления рабочего раствора «Олдез/Alldez» в виде холодного или горячего тумана осуществляют с помощью генераторов Igeba, Swingtec, Cifarelli, Oleo-Mac, Efco, АГСФ-2-5, АПА-20 или другого подобного оборудования. Рабочий

раствор готовят из расчета 1 мл «Олдез/Alldez» на 1м 3 помещения. Для эффективного распределения действующего вещества следует развести «Олдез/Alldez» водой (1 часть «Олдез/Alldez» на 4 части воды). Дезинфекция животноводческих помещений проводится в отсутствие животных. Рабочий раствор распыляют при выключененной вентиляции с экспозицией минимум 3 часа. При работе с аэрозольными генераторами следует соблюдать стандартные меры безопасности: использовать защитный костюм, сапоги, перчатки, противогаз. Оборудование рекомендуется подбирать для распыления всего необходимого объема рабочего раствора не более чем за 1 час. По истечении экспозиции места возможного скопления остатков дезсредства, доступные для животных (включая кормушки, поилки и другие участки поверхностей) промываются водой, с остальных поверхностей смывание остатков дезсредства не требуется. Животных вводят в помещения после проветривания.

3.5. Санацию воздушного бассейна животноводческих и птицеводческих помещений в присутствии животных (птицы) проводят с целью снижения содержания патогенной микрофлоры в воздухе помещений и на поверхностях и профилактики респираторных заболеваний животных (птицы). Обработка проводится методом аэрозольного распыления

рабочего раствора «Олдез/Alldez» в виде холодного тумана. Используется 0,5% рабочий раствор в дозе 5 мл на 1М 3 воздуха помещения. Периодичность санации – 1 раз в 7-10 дней. Оборудование рекомендуется подбирать для распыления всего необходимого объема рабочего раствора за 30-60 мин.

3.6. Профилактическую и вынужденную дезинфекцию птицеводческих помещений и оборудования проводят 0,5-1% раствором «Олдез/Alldez» методом орошения или генерации пены при расходе 0,25-0,30 л/м 2 и экспозиции 60 мин. или аэрозольным методом с использованием аэрозольных генераторов. Пол, стены, несущие конструкции, каналы пометоудаления дополнительно обеззараживают методом орошения 0,5-1% раствором, время экспозиции 60 мин.

Системы кормления и ниппельного поения промывают 0,25% раствором ручным способом с помощью ветоши, смоченной в растворе, щеток и ершей при экспозиции 30 минут, труднодоступных участков и при механизированном способе (рециркуляция раствора в системе) 45 минут, а при значительной удаленности от моечной станции 60 минут с расходом рабочего раствора 0,3 л/м 2 .

3.7. Дезинфекция в инкубаториях.

3.7.1. Обработка инкубационного яйца.

3.7.1.1. Первая обработка должна осуществляться в кратчайшие сроки после снесения яйца (через 1-2 часа) во избежание проникновения микроорганизмов внутрь яйца через поры. Допускается дезинфицировать яйца, собранные за день. Вторая обработка проводится непосредственно перед помещением яйца в инкубатор. В случае появления в процессе инкубации большого количества тумаков или при иных признаках неблагоприятной микробиологической обстановки можно провести третью обработку в инкубационной камере в любое время, исключая период 12-96 часов и период наклева и вывода молодняка.

3.7.1.2. Обработки производятся в дезинфекционных камерах при помощи генератора холодного тумана. Используется 10% р-р средства «Олдез/Alldez» из расчета 20 мл/М 3 пространства камеры, экспозиция 30 мин. При дезинфекции методом орошения используется 0,5% р-р «Олдез/Alldez», обработка производится до полного увлажнения скорлупы яйца.

3.7.2. Обработка оборудования инкубаториев.

3.7.2.1. Чтобы дезинфекция была успешной, все объекты предварительно должны быть тщательно вымыты, остатки моющего средства удалены ополаскиванием водой. После проведения дезинфекции ополаскивание обязательно, остатки средства сохраняют антимикробное действие на поверхности в течение 4-7 дней после нанесения.

3.7.2.2. Зал вывода, помещения для сексирования, помещение для проведения операций с цыплятами и моечная должны мыться и дезинфицироваться после каждого вывода. Помещение для приемки яиц, зал инкубации, другие помещения по крайней мере раз в неделю.

3.7.2.3. При дезинфекции инкубационного оборудования с помощью пеногенератора, орошением, протиранием, обработки спреем применяют 0,5% раствор «Олдез/Alldez», расход рабочего раствора – 0,25 л/м².

3.7.2.4. При объемной дезинфекции используют генератор холодного тумана, применяют 5% раствор «Олдез/Alldez» из расчета 20 мл рабочего раствора на 1 м³ объема помещения.

3.8. Для вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции при птичьем гриппе применяют 0,25% водный раствор «Олдез/Alldez» с нормой расхода 0,25- 0,3 л на м². Сильно загрязненные поверхности и поверхности из пористых материалов обеззараживают 0,3% раствором методом орошения при экспозиции 60 мин.

3.9. Допускается проведение в присутствии животных локальной дезинфекции отдельных свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствия людей, животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам. Обработку следует проводить 0,25% раствором «Олдез/Alldez » методом генерирования пены или методом протирания поверхности.

3.10. Дезбарьер или дезковрики заправляют 0,5% раствором «Олдез/Alldez». Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 7 дней.

3.11. Спецодежду обеззараживают 0,25-0,5% раствором методом замачивания на 1 час в закрывающихся крышкой ёмкостях, в соотношении 4 л раствора на 1 кг сухой спецодежды. По окончанию экспозиции спецодежду хорошо прополаскивают в воде с последующей стиркой в обычном порядке.

3.12. Спецобувь тщательно очищают от механической грязи: помета, пуха, пера, навоза и т.д. протирают ветошью, смоченной 0,25% раствором, оставляют на 1 час. После обеззараживания обувь моют под струей горячей воды.

3.13. Растворы средства применяют для дезинфекции изделий ветеринарного назначения (включая инструменты), поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, посуды, предметов ухода за животными; для дезинфекции высокого уровня ветеринарных инструментов; для дезинфекции транспорта, в котором перевозятся животные;

для проведения генеральных уборок. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания. Режимы дезинфекции объектов приведены в табл. 2-6. Генеральные уборки в помещениях лечебно- профилактических учреждений для животных (СБЖ) проводят согласно режимам табл. 7. Дезинфекцию изделий ветеринарного и медицинского назначения проводят в соответствии с режимами табл. 8.

3.14. Предметы ухода за больными животными погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.15. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой.

3.16. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

3.17. Дезинфекцию ветеринарных изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости изделий должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1см.

3.18. Растворы средства для дезинфекции изделий ветеринарного назначения могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Олдез/Alldez» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату),%	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования; транспорт для перевозки животных	0,25	30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,25	30	Двукратное протирание или двукратное

			орошение с интервалом 15 мин
Посуда лабораторная	0,25	30	Погружение
Предметы ухода за больными животными	0,25	30	Погружение
	0,25	60	Погружение
	0,5	60	Протирание
	0,25	30	Двукратное протирание с интервалом 15 мин.
Уборочный инвентарь	0,5	60	Погружение

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Олдез/Alldez» при вирусных инфекциях.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования; санитарный транспорт	0,25	60	Протирание или орошение
Санитарно-техничес кое оборудование	0,25	60	Протирание или орошение
Предметы ухода за больными животными	0,5	30	Погружение или протирание
Посуда лабораторная	0,5 1,0	60 30	Погружение Протирание

Уборочный инвентарь	1,0	60,0	Погружение
---------------------	-----	------	------------

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Олдез/Alldez» при туберкулезе

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования; санитарный транспорт	0,5-1,0	60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	1,0	60	Протирание или орошение
Предметы ухода за больными животными	0,5 1,0	60 30	Погружение или протирание
Посуда лабораторная	0,5	30	Погружение
Уборочный инвентарь	0,5 1,0	60,0 30	Погружение

Таблица 5 Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Олдез/Alldez» при африканской чуме свиней (проводит испытания ФГБМУ ФИЦВиМ)

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара живания, мин	Расход рабочего раствора, л/м ²	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях,	0,5	120	0,3	Протирание или орошение

жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования; санитарный транспорт	1,0	30		
Санитарно-техническое оборудование	0,5 1,0	120 30	0,3	Протирание или орошение
Предметы ухода за больными животными	0,5 1,0	120 30	0,3	Погружение или протирание
Посуда лабораторная	0,5 1,0	120 30	0,3	Погружение
Уборочный инвентарь	0,5 1,0	120 30	0,3	Погружение
Резиновые коврики	0,5 1,0	120 30	0,3	Погружение или протирание

Таблица 6 Режимы дезинфекции птицеводческих помещений и оборудования растворами средства «Олдез/Alldez»

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования; санитарный транспорт	0,5-1 25%	60 180	Протирание или орошение Аэрозольно
Санитарно-техническое оборудование	0,5-1	60	Протирание или орошение
Предметы ухода	1,0	30	Протирание

	0,5	30	Двукратное протирание с интервалом 15 мин
	0,5	60	Погружение
Посуда	0,5	30	Погружение
Уборочный инвентарь	0,25	60	Погружение
	0,5	30	Орошение

Таблица 7 Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Олдез/Alldez» при дерматофитиях

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования; санитарный транспорт	0,5 1,0	60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	1,0	60	Протирание или орошение
		60	Двукратное протирание или двукратное орошение
Предметы ухода за больными животными	1,0 0,5	60 60	Погружение или протирание
Посуда лабораторная	0,5	60	Погружение
Уборочный инвентарь	1,0	60,0	Погружение
Резиновые коврики, дезковрик,	1,0	60	Погружение или протирание

дезбарьеры			
------------	--	--	--

Таблица 8 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Олдез/Alldez» при проведении генеральных уборок в лечебно -профилактических учреждениях для животных (изоляторы, боксы), в животноводческих помещениях.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Места для лечения больных животных, ветеринарные клиники (станции), лаборатории	0,25	60	Протирание
Места содержания больных животных, виварии, цирки, зоопарки	0,25	30	Протирание
Ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных(СББЖ)	0,25 1,0	60 30	Погружение орошение

Таблица 9 Режимы дезинфекции изделий ветеринарного назначения(включая хирургические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства «Олдез/Alldez»

Примечание: Рекомендуется разводить дистиллированной водой.

Объект обеззараживания	Вид обработки	Концентрация рабочего раствора(по препарату),%	Время дезинфекционной выдержки, мин
Изделия из резин, стекла, пластика, металлов	Дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях	0,5 1,0	60 30

Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним	Дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях	0,5	15
Жесткие и гибкие эндоскопы	Дезинфекция высокого уровня	25	5

3.19. Смыв остатков средства с изделий ветеринарного назначения необходимо проводить под проточной питьевой водой в течении 10 мин, через каналы изделий пропускают не менее 20 мл воды с помощью шприца или электронасоса.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ

4.1. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002г.). В качестве нейтрализатора используют стерильную воду.

4.2. Средство «Олдез/Alldez» применяют с целью обеззараживания ветеринарных отходов, представляющих собой отработанные изделия и материалы однократного применения, относящиеся по степени опасности в согласно СанПиНу 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно- профилактических учреждениях» к классу Б - опасным (рискованным) отходам, также применяют в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469) (с изменениями от 16 августа 2007 г.) и Федеральным законом «О ветеринарии».

4.3. «Олдез/Alldez» не совместим с анионными ПАВ и их растворами. Для применения рабочих растворов «Олдез/Alldez» при отрицательных температурах рекомендуется готовить рабочий раствор «Олдез/Alldez» на основе 30% водного раствора этиленгликоля.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет или страдающие аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам, имеющими противопоказания для работы с дезинфицирующими средствами.

5.2. Все работы проводить в отдельном, хорошо проветриваемом помещении с защитой кожи рук резиновыми перчатками. При приготовлении рабочих растворов «Олдез/Alldez» следует избегать попадания средства внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания. При приготовлении рабочих растворов глаза следует защищать защитными очками, пользоваться защитной маской и другой спецодеждой. Во время работы запрещается

курить, пить и принимать пищу. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В), глаз (герметичные очки), кожи рук (резиновые перчатки). После проведен дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветривание помещения; руки и лицо следует вымыть с мылом, рот прополоскать.

5.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания проводить в отсутствии животных.

5.4. Ёмкости с рабочими растворами при использовании их для замачивания и погружения объектов должны быть закрыты крышками. Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.

5.5. Контейнер из-под средства не использовать повторно.

5.6. Средство рекомендуется хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5.7. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

6.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое чистое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

6.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! Обратиться к врачу.

6.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

6.5. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

6.6. В случае появления признаков отравления (головокружения, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

6.7. «Олдез/Alldez» следует хранить в местах, не доступных для детей.

7. УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Средство «Олдез/Alldez» выпускается в полиэтиленовом флаконе 1 л, или в полиэтиленовых канистрах по 5 л, 10, 20 л, а также по 210 л в полиэтиленовых бочках. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации- производителя, ее адреса и товарного знака, с указанием названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объема упаковки, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности, а также снабжают инструкцией по применению.

7.2. Средство транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары.

7.3. Срок годности средства составляет 3 года при условии хранения в невскрытой упаковке изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 35°C. Срок хранения растворов - не более 14 суток. По истечению срока годности не должен применяться.

7.4. В аварийных ситуациях следует использовать спецодежду – халат или комбинезон, резиновый фартук, резиновые сапоги, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа «РПГ-67» или «РУ-60М» с патроном марки В), глаз (защитные очки), кожи рук (резиновые перчатки). При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим материалом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

7.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

8.1. Средство «Олдез/Alldez» контролируют по показателям, приведенным в таблице.
Таблица 10 Показатели качества и нормы.

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид и запах	Жидкость коричневого цвета со специфическим запахом
2. Показатель активности водородных ионов (20°C) 1% раствора средства, единиц pH	3,0-5,0
3. Плотность (20°C), г/см3	1,000-1,040
4. Массовая доля ЧАС (алкилдиметилбензил-аммоний хлорид и дидецилдиметиламмоний	24,8 ±1,2

хлорид), %	
5. Массовая доля глутарового альдегида, %	10,7 ±0,5

8.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства определяют просмотром 25-30 мл средства в стакане из бесцветного стекла на белом фоне.

8.3. Определение плотности.

Плотность (20°C) измеряют с помощью пикнометра или ареометра.

8.4. Определение показателя активности водородных ионов.

Показатель активности водородных ионов (20°C) измеряют в 1% растворе средства потенциометрическим методом.

8.5. Определение массовой доли четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмония хлорид и дидецилдиметил-аммоний хлорид).

Определение основано на методе двухфазного титрования. Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного стандартного раствора (натрий додецилсульфат) при добавлении смешанного индикатора из катионного красящего вещества (эозин БА и эозин Н) и анионного красящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

8.5.1. Приборы, реактивы, растворы.

Весы лабораторные аналитические с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Цилиндр мерный со шлифом вместимостью 25 мл; 100 мл.

Колбы мерные вместимостью 100, 250 мл.

Бюretка вместимостью 25 мл.

Пипетки вместимостью 1; 5; 10 мл.

Натрий додецилсульфат ГСО 8049-94 (фиксант).

Метиленовый голубой (индикатор).

Эозин БА или эозин Н (индикатор).

Хлороформ ч.д.а.

Кислота серная, ч.д.а.; 0,1 н раствор.

Кислота уксусная (ледяная) ч.д.а.

Вода деминерализованная или дистиллированная.

8.5.2. Подготовка к анализу.

8.5.2.1. Приготовление стандартного раствора натрий додецилсульфата.

В мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют в воде содержимое ампулы (0,1 г) и дополняют объем до калибровочной метки, получают стандартный раствор с молярной концентрацией 0,00342 моль/л натрий додецилсульфата.

8.5.2.2. Приготовление раствора смешанного индикатора.

Раствор А: 0,7 г эозина БА или эозина Н растворяют в 5 мл воды в мерной колбе вместимостью 250 мл, приливают 2,5 мл уксусной кислоты, доводят объем раствора этиловым спиртом до метки и перемешивают. Раствор Б: 0,04 г индикатора метиленового голубого растворяют в 75 мл воды в стакане вместимостью 200 мл, прибавляют 15 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают. Растворы А и Б хранят в отдельных склянках. Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора Б прибавляют равные четыре части раствора А и перемешивают. Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед проведением анализа в необходимом количестве.

8.5.3. Проведение анализа.

Около 1,5 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, вносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. 20 мл приготовленного раствора дозируют с помощью пипетки в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 мл, прибавляют 4 мл воды, 20 мл хлороформа, 5 мл 0,1 н серной кислоты, 1 мл свежеприготовленного раствора смешанного индикатора и титруют стандартным раствором натрий додецилсульфата. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата цилиндр закрывают притертой пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до окрашивания хлороформного слоя в зелено-голубой цвет.

8.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю определяемого вещества в средстве (Х, %) вычисляют по

формуле:

$$X = \frac{0,00125 * V_1 * V_2 * 100}{V_3 * m}, \text{ где:}$$

$V_3 * m$

0,00125 - средняя масса четвертичных аммониевых соединений, соответствующая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с (С 12 Н 25 SO 4 Na)

=0,00347 моль/л, мг;

V_1 - объем титранта - раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с

(С 12 Н 25 SO 4 Na) =0,00347 моль/л, израсходованный на титрование, см 3 ;

V 2 - объем раствора пробы (после разведения 250 см 3), см 3 ;

V 3 - объем раствора пробы, взятый на титрование (20 см 3), см 3 ;

m - масса пробы, г.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 0,2%. В случае превышения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 2\%$ для доверительной вероятности 0,95.

8.6. Определение массовой доли глутарового альдегида

8.6.1. Определение массовой доли глутарового альдегида титриметрическим методом. Определение основано на титровании раствором гидроокиси натрия соляной кислоты, образующейся в результате взаимодействия альдегидов с гидроксиламмоний хлоридом.

8.6.1.1. Приборы, реактивы, растворы.

Весы лабораторные аналитические с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюretка вместимостью 10 мл.

Пипетки вместимостью 0,1; 1; и 5 мл.

Цилиндры вместимостью 25 мл.

Колбы конические вместимостью 25, 200 мл.

Бромфеноловый синий; раствор с массовой долей 0,1% (индикатор).

Гидроксиламин гидрохлорид ; водный раствор с массовой долей 7%.

Натрия гидроокись ч.д.а.; 0,5 М раствор; раствор концентрации с (NaOH) =0,1 моль/л (0,1 н).

Вода дистиллированная.

8.6.1.2. Подготовка к анализу.

Перед проведением анализа в 25 мл раствора гидроксиламингидрохлорида добавляют несколько капель индикатора и 0,5М раствор гидроокиси натрия до появления синего окрашивания.

8.6.1.3. Проведение анализа.

В конической колбе вместимостью 25 мл взвешивают 0,5-0,6 мл средства, результаты записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в 10-11 мл воды, затем добавляют 2 мл ацетонитрила и около 2 г натрия хлористого, осторожно перемешивают круговыми движениями и дают

отстояться. Темно-окрашенные вещества выделяются в верхний слой раствора, образующий кольцо по стенкам колбы. Из отстоявшегося раствора аккуратно отбирают 5-6 мл нижнего слоя, переносят в колбу для титрования, дозируют 15 мл воды, 0,1 мл раствора индикатора и добавляют 0,5M раствор натрия

гидроокиси до изменения светло-желтого цвета пробы на сине-зеленый. Затем в пробу добавляют 25 мл подготовленного раствора гидроксиламина хлорида и выдерживают в течение 20 мин., после чего проводят титрование стандартным 0,1 M раствором натрия гидроокиси до перехода окрашивания от желтого до сине-зеленого цвета.

8.6.1.4 Обработка результатов.

Массовую долю глутарового альдегида в средстве (X, %) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{0,00501 * V_1 * V_3 * 100}{V_2 * m}, \text{ где:}$$

$$V_2 * m$$

0,00501 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 мл раствора натрия

гидроокиси концентрации точно с (NaOH) = 0,1 моль/л, г;

V 1 - объем раствора натрия гидроокиси концентрации точно с (NaOH) = 0,1 моль/л, израсходованный на титрование, мл;

V 2 - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;

V 3 - суммарный объем раствора при выделении темно-окрашенных веществ, мл;

m - масса средства, взятая на анализ, г. За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 1%.

8.6.2. Определение массовой доли глутарового альдегида газохроматографическим методом.

Газохроматографическое определение массовой доли глутарового альдегида проводят с применением пламенно-ионизационного детектирования, изотермического хроматографирования пробы на полимерном адсорбенте и использованием абсолютной градуировки.

8.6.2.1. Средства измерения, оборудование, реактивы.

Газовый хроматограф «Кристалл 2000М», снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой 100 x 0,3 см, программным обеспечением на базе персонального компьютера Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц вместимостью 1 мкл.

Колбы мерные вместимостью 100 мл.

Пипетки вместимостью 2, 10 мл.

Глутаровый альдегид 50% водный раствор с точно установленным содержанием основного вещества.

Адсорбент - Полисорб-1 (0,10-0,25мм).

Ацетонитрил ч.

Натрий хлористый ч.

Вода дистиллированная.

Азот газообразный.

Водород из баллона или от генератора водорода.

Воздух из баллона или от компрессора.

8.6.2.2. Приготовление градуировочной смеси.

В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 0,5 г 50% раствора глутарового альдегида, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, и добавляют воду до калибровочной метки. После перемешивания 1 Мкл градуировочной смеси вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси.

Анализируемую пробу и градуировочную смесь хроматографируют при следующих условиях:

- объемный расход, мл/мин.: азот 20, водород 25, воздух 250
- температура, °С испарителя 220, детектора 240
- температура колонки 160°C
- объем дозы в хроматограф 1 мкл. Примерное время удерживания глутарового альдегида 11,3 мин. Условия хроматографирования могут быть изменены для достижения эффективного разделения компонентов в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

8.6.2.3 Выполнение анализа.

В коническую колбу вместимостью 25 мл вносят около 0,6 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в 10 мл воды, добавляют 2 мл ацетонитрила, затем вносят около 2 г натрия хлористого, осторожно перемешивают круговыми движениями и дают отстояться. Темно-окрашенные вещества выделяются в верхний слой раствора, образуя кольцо по стенкам колбы. После отстаивания отбирают 1 мл нижнего слоя, разбавляют водой при соотношении 1:1 и 1 мкл вводят в хроматограф; из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика глутарового альдегида в анализируемой пробе.

8.6.2.4 Обработка результатов

Массовую долю глутарового альдегида ($X, \%$) в средстве вычисляют по формуле:

$$X = \frac{S_{\text{ГС}} * C_{\text{ГС}} * V * k * 100}{m}, \text{ где:}$$

$$S_{\text{ГС}} * m$$

$S_{\text{ГС}}$ и S - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в анализируемой пробе и градуировочной смеси;

$C_{\text{ГС}}$ - массовая концентрация глутарового альдегида в градуированной смеси, мг/см³;

V - объем раствора средства, см³;

k - кратность разведения пробы ($k=2$);

m - масса средства, взятая на анализ, мг.

За результат анализа принимают среднее значение двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 10%.

Приложение 1

Спектр антимикробной активности средства для дезинфекции объектов ветеринарного надзора

«Олдез/Alldez».

Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора

«Олдез/Alldez» является дезинфектантом высокого уровня, относится к 1 группе дезинфектантов с высокой активностью. Средство обладает спороцидной и туберкулоцидной активностью. Средство эффективно против всех известных бактерий, грибов, вирусов всех трех классов устойчивости. Средство уничтожает все бактерии, грибы и вирусы I-IV групп патогенности.