



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «БИОСТИМ»

Н.Н.Куконин

ИНСТРУКЦИЯ

по применению АНТИСЕПТИКА – СТИМУЛЯТОРА Д-3 фракции для лечения инфицированных вяло заживающих ран, дерматитов, хронических воспалительных повреждений кожи и копыт, трофических язв, свищей, некробактериоза, гинекологических заболеваний различной этиологии у животных, а также при каннибализме свиней и расклеве у птицы.

(организация-разработчик ООО «БИОСТИМ», г.Бобров)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция (ANTISEPTIC-STIMULATOR D-3 fraction).

Международное непатентованное наименование: отсутствует.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция является продуктом сухой перегонки тканей животного происхождения и содержит в своем составе метены, пиридиновые основания, карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы – не менее 87%, фенолы - не более 5%, а также меркаптановые соединения и воду - до 100%.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от темно-коричневого до черного цвета со специфическим запахом. Допускается выпадение мелкодисперсного осадка черного цвета.

3. АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция выпускают расфасованным по 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 400 и 500 мл в полимерные или стеклянные флаконы, по 1 и 2,5 л в полимерные бутылки соответствующей вместимости, по 3, 5, 10, 20 л в полимерные канистры соответствующей вместимости.

Стеклянные флаконы укупоривают резиновыми пробками и обкатывают алюминиевыми колпачками, бутылки и полимерные флаконы укупоривают навинчивающимися пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия и снабжают инструкцией по применению. Флаконы по 10, 20, 50, 100, 150, 200 и 250 мл упакованы в индивидуальные картонные коробки, в которые вложена инструкция по применению.

Предусмотрена фасовка лекарственного препарата по 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мл в пластиковые, алюминиевые и жестяные моноблоочные баллоны с инертным газом под давлением с насадкой для распыления.

4. АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности АНТИСЕПТИКА – СТИМУЛЯТОРА Д-3 фракция при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 4 года с даты производства. Срок хранения лекарственного препарата после вскрытия стеклянных и полимерных флаконов - не более 14 суток.

АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция запрещается применять по истечении срока годности.

5. АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7 АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция относится к группе биогенных стимуляторов.

АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция является жирорастворимой фракцией продукта сухой перегонки тканей животного происхождения. Получают препарат путем сухой перегонки тканей животного происхождения. Лекарственный препарат стимулирует активность ретикуло-эндотелиальной системы, нормализует трофические процессы и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. Также обладает репелентными свойствами и запахом, останавливающим от расклева и каннибализма.

По степени воздействия на организм АНТИСЕПТИК–СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракцию назначают с лечебно-профилактической целью животным, для лечения инфицированных вяло заживающих ран, дерматитов, хронических воспалительных повреждений кожи и копыт, трофических язв, свищей, некробактериоза, гинекологических заболеваний различной этиологии у животных, а так же при каннибализме свиней и расклеве у птиц.

9. Запрещается применять лекарственный препарат животным при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

10. АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 применяют наружно в виде 20 - 50%-го масляного раствора. Масляные растворы препарата готовят в асептических условиях с использованием касторового, льняного, подсолнечного, минерального масел, в которые при тщательном перемешивании добавляют АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция в соотношении 1:1 или 1:5. В нативном виде АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 применяют наружно в виде аэрозоля, распыляя на расстоянии 15 – 20 см непосредственно на поврежденную поверхность кожи или конечностей, один раз в сутки до выздоровления животного и птицы.

При гинекологических заболеваниях АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция применяют при вагинитах интравагинально, а эндометритах – внутриматочно в виде 20-50% масляных растворов.

При лечении инфицированных вяло заживающих ран и свищей, проводят санитарную обработку пораженного участка до полного удаления гнойного экссудата и после этого накладывают смоченную 20% масляным раствором АНТИСЕПТИКА – СТИМУЛЯТОРА Д-3 фракция марлевую салфетку, которую фиксируют бинтом. Смену салфеток с лекарственным препаратом проводят ежедневно до выздоровления животного.

При экземах, пролежнях, дерматитах, хронических воспалительных поражениях кожи, пиодермии и трофических язвах на пораженные участки кожи наносят 20-50% масляные растворы препарата один раз в сутки, с захватом 2-3 см здоровой кожи (с целью предупреждения распространения очага воспаления). Лечение проводят до выздоровления животного.

При обширных поражениях препарат наносят попеременно на разные участки, покрывая за одну обработку не более 1/10 поверхности тела животного.

При заболеваниях кожи и копыт – наружно в нативном виде аэрозольно или в форме масляных растворов и мазей.

При некробактериозе животных и копытной гнили овец после санитарной обработки пораженных участков конечностей их смазывают или обрабатывают препаратом в нативном виде аэрозольно один раз в день. Лечение проводят в комплексе с местными хирургическими обработками и лекарственными средствами специфической и симптоматической терапии до выздоровления животного.

При каннибализме свиней и расклеве у птицы препарат применяют в нативном виде непосредственно на поврежденную поверхность кожи, аэрозольно, один раз в сутки до выздоровления животного и птицы.

При вагинитах, эндометритах, пиометре, вызванных трихомонозом или патогенной микрофлорой: коровам вводят во влагалище 20% масляный раствор препарата при помощи шприца Жане с катетером. На одну процедуру расходуют 200-300 мл раствора. Рекомендуется также во влагалище вводить марлевые тампоны, пропитанные раствором. Лечение проводят 1 раз в день до выздоровления.

При попадании на участки здоровых тканей большого количества нативного препарата возможно выраженное раздражение тканей вплоть до ожога. При необходимости провести противоожоговую терапию (удалить с поверхности ватно марлевым тампоном остатки препарата и обильно промыть не менее 3-х раз водой).

11. Симптомы передозировки при применении препарата АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция в соответствии с инструкцией не выявлены.

12. Особеностей действия при первом применении лекарственного препарата и при его отмене не установлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. При применении лекарственного препарата АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не установлено.

15. АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция совместим с различными группами лекарственных препаратов.

16. Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных и яйца птицы после применения препарата АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция используются в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д - 3 фракция следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к препарату следует избегать прямого контакта с препаратом АНТИСЕПТИК – СТИМУЛЯТОР Д - 3 фракция. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «БИОСТИМ», 397705, Россия, Воронежская обл., Бобровский р-н, г. Бобров, станция Битюг, д. 5, оф.1.

Место производства: Россия, Воронежская обл., Бобровский р-н, юго-западная часть кадастрового квартала 36:02:5400027.

Инструкция разработана фирмой ООО «БИОСТИМ», Россия, 397705, Воронежская обл., Бобровский р-н, г. Бобров, станция Битюг, д. 5, оф. 1.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-2837-14

Директор ООО «БИОСТИМ»

Н. Н. Куконин