

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Азинокса для собак и кошек при цестодозах

(Организация-производитель: ООО “Научно-внедренческий центр
Агроветзащита С.-П.”, г. Сергиев Посад, Московская область)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Азинокс для собак и кошек (Azinox for dogs and cats).

Международное непатентованное наименование: празиквантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Азинокс для собак и кошек в качестве действующего вещества в 1 таблетке содержит празиквантел (азинокс) - 50 мг, а также вспомогательные компоненты: лактозу - 300 мг и крахмал картофельный - 150 мг. Генно-инженерно-модифицированных продуктов не содержит.

Выпускают препарат расфасованным по 3 или 6 таблеток в блистеры из поливинилхлоридной пленки, упакованные поштучно в картонные коробки.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления.

Запрещается применять Азинокс для собак и кошек по истечении срока годности.

4. Хранят Азинокс для собак и кошек в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰С до 25⁰С.

5. Азинокс для собак и кошек следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют с бытовыми отходами.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Азинокс для собак и кошек относится к антигельминтным препаратам цестодоцидного действия.

Входящий в состав препарата празиквантел обладает широким спектром антигельминтного действия на все фазы развития ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в том числе *Echinococcus*

granulosus, *Echinococcus multilocularis*, *Mesocestoides* spp., *Taenia* spp., *Dipylidium caninum* и *Diphyllobothrium latum*.

Механизм действия празиквантела заключается в угнетении активности фумаратредуктазы, нарушении проницаемости клеточных мембран и мышечной иннервации, что приводит к параличу и гибели гельминта.

Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, его максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30-60 минут. Выводится из организма в основном с мочой в течение 24 часов.

Азинокс для собак и кошек по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится собаками и кошками разных пород и возраста.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Азинокс для собак и кошек назначают для лечения и профилактики цестодозов (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, дифиллоботриоз, мезоцеостоидозы).

9. Противопоказанием к применению Азинокса для собак и кошек является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Препарат не следует применять щенкам и котятам моложе 3-недельного возраста.

10. Азинокс для собак и кошек применяютperorально индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного.

Кошкам и собакам массой менее 5 кг препарат применяют в виде водной суспензии, для приготовления которой 1 таблетку измельчают, суспендируют в 10 мл воды, интенсивно взбалтывают и тотчас вводят животному внутрь с помощью шприца без иглы из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

11. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией животных не требуется.

12. С лечебной целью собак и кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально в терапевтической дозе.

13. Симптомы передозировки не выявлены.

14. Побочных явлений и осложнений у собак и кошек при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к празиквантелу и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Азинокса для собак и кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

16. Во время работы с препаратом запрещается курить пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

17. Организация-производитель: ООО “Научно-внедренческий центр Агроветзащита С.-П.”, 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Азинокса для собак и кошек, утвержденную Россельхознадзором 30 декабря 2005 года.

Инструкция разработана ООО “Научно-внедренческий центр Агроветзащита”; 129329, г. Москва, Кольская ул., 1 стр.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ “ВГНКИ”.

Регистрационный номер *ДВР-2-12/00898*