

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

28.03.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
БАРС® капли ушные

(организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия,
129329, г. Москва, Игарский проезд, д.4, стр.2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-7.0-3713№ПВР-2-1.9/00110

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: БАРС® капли ушные (BARS® ear drops);
международное непатентованное наименование: диазинон, преднизолон.
2. Лекарственная форма: капли ушные.
БАРС® капли ушные в 1 мл в качестве действующих веществ содержит диазинон – 0,5 мг и преднизолон – 0,3 мг, а в качестве вспомогательных веществ: глицерин и спирт изопропиловый.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.
Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.
4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 10 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми или алюмопластиковыми колпачками с клипсами контроля первого вскрытия; по 15, 20 и 30 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы и флаконы-капельницы индивидуально помещают в картонные пачки и снабжают инструкцией по применению препарата.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта (требования) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. БАРС® капли ушные относятся к лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы – инсектоакарицидные средства в комбинации.

10. Входящий в состав лекарственного препарата диазинон, является фосфорорганическим соединением кишечного-контактного действия, обладает выраженной акарицидной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития клещей, паразитирующих на собаках и кошках, в том числе возбудителя отодектоза собак и кошек - *Otodectes cynotis*.

Преднизолон - синтетический глюкокортикостероид, обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием, стабилизирует проницаемость клеточных мембран, препятствует выработке медиаторов воспаления, оказывает противоотечное и противоаллергическое действие.

БАРС® капли ушные по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. БАРС® капли ушные назначают собакам и кошкам для лечения отодектоза (ушной чесотки).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применение препарата животным при прободении барабанной перепонки.

13. При работе с лекарственным препаратом БАРС® капли ушные следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом БАРС® капли ушные.

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применять лекарственный препарат беременным самкам. Животным в период лактации препарат может назначаться по «жизненным» показаниям и применяться под контролем ветеринарного врача. Не следует применять лекарственный препарат щенкам и котятм моложе 4-недельного возраста.

15. БАРС® капли ушные применяют собакам и кошкам. Перед применением лекарственного препарата проводят гигиеническую обработку ушной раковины и наружного слухового прохода. После этого лекарственный препарат закапывают пипеткой в каждое ухо по 3-5 капель препарата (кошкам и мелким собакам – 3, средним собакам – 4 и крупным собакам – 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода, ушную раковину складывают вдоль и слегка массируют ее основание.

Обработку проводят двукратно с 5-7-дневным интервалом до клинического

выздоровления животного, которое подтверждают микроскопическими исследованиями соскобов. При необходимости курс лечения повторяют.

БАРС® капли ушные обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного.

В случае если животное трясет головой после применения лекарственного препарата, для предотвращения его разбрызгивания, голову животного следует в течение нескольких минут фиксировать.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и проявлении аллергических реакций (кожный зуд, повышенная саливация, рвота) его использование прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

17. При передозировке или попадании препарата внутрь, у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае проводят симптоматическую и десенсибилизирующую терапию.

18. БАРС® капли ушные не следует применять одновременно с другими акарицидными препаратами для обработки животных. Информация о его несовместимости с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении и при отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности лечения. В случае пропуска очередной обработки, лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.
Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор
ООО «НВЦ Агроветзащита»



С.В. Енгашев