

08 ИЮН 2022

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Элеовит

(Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+», 142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, ул. Строителей, строение 2)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-8.14-3396№ПВР-3-3.3/01271

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Элеовит (Eleovit).

Международное непатентованное наименование: ретинол, колекальциферол, альфа-токоферола ацетат, менадион, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин, биотин, никотинамид, пантотеновая кислота, фолиевая кислота.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Элеовит в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А – 10 000 МЕ, витамин Д<sub>3</sub> – 2 000 МЕ, витамин Е – 10 мг, витамин К<sub>3</sub> – 1 мг, витамин В<sub>1</sub> – 10 мг, витамин В<sub>2</sub> – 4 мг, витамин В<sub>3</sub> – 30 мг, витамин В<sub>5</sub> – 20 мг, витамин В<sub>6</sub> – 3 мг, витамин В<sub>7</sub> – 10 мкг, витамин В<sub>9</sub> – 0,2 мг, витамин В<sub>12</sub> – 10 мкг и вспомогательные вещества: гидролизат белка лактоальбумина, нипагин, глюкозу, воду для инъекции.

3. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость (допускается опалесценция) от светло-желтого до светло-коричневого цвета со специфическим запахом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После вскрытия флакона неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается применение Элеовита по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 5, 10, 20, 50 и 100 мл в стеклянные флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками с колпачками комбинированными с пластмассовыми крышками, жестко закрепленными в дне алюминиевых колпачков. Флаконы по 5 мл помещают в

картонную пачку по 5 или 10 штук; флаконы по 10 мл – в картонную пачку по 10 штук или по 50 штук в картонную коробку; по 20 мл – по 60 штук в картонную коробку; по 50 мл – по 50 или 72 штуки в картонную коробку; по 100 мл – по 12 или 50 штук в картонную коробку. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Элеовит в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Элеовит следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: комбинированный витаминный препарат. Поливитамины.

10. Входящие в состав Элеовита витамины оказывают синергидное действие. Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая защитную функцию организма животных. Витамин Д участвует в обмене кальция и фосфора, обладает противорахитическим действием. Витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает действие витаминов А и Д. Витамины группы В играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов.

По степени воздействия на организм Элеовит относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсibiliзирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

## III. Порядок применения

11. Элеовит назначают с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным животным при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся на их фоне (ксерофтальмии, рахите, остеомаляции, тетании), для повышения воспроизводительных функций, а также как вспомогательное средство при лечении дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек.



12. Противопоказанием к применению Элеовита является гипервитаминоз и повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. К работе с препаратом не допускаются лица с признаками аллергических, респираторных, желудочно-кишечных заболеваний или кожных поражений.

14. Особенности применения у беременных животных, у животных в период лактации, у потомства животных не выявлено.

15. Элеовит вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола в сторону во избежание вытекания раствора. В зимнее время перед применением препарат следует подогреть на водяной бане до комнатной температуры.

С профилактической целью (при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровлений после перенесенных заболеваний) Элеовит вводят один раз в 2-3 недели.

С лечебной целью лекарственный препарат вводят один раз в 7-15 дней.

Супоросным свиноматкам Элеовит вводят за 1,5-2,0 месяца до опороса.

| Вид животного        | Возрастная и технологическая группа | Количество в сутки, мл на голову |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Крупный рогатый скот | взрослое поголовье                  | 5-6                              |
|                      | молодняк (6-12 месячный возраст)    | 2-3                              |
| Лошади               | взрослое поголовье                  | 3-5                              |
|                      | молодняк (6-12 месячный возраст)    | 2-3                              |

|            |                        |     |
|------------|------------------------|-----|
| Свиньи     | взрослое поголовье     | 2   |
|            | поросята-отъемыши      | 1,5 |
|            | поросята-сосуны        | 1   |
|            | новорожденные поросята | 0,5 |
| Овцы, козы | взрослое поголовье     | 1-2 |
|            | ягнята, козлята        | 1   |

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных не выявлено. В месте инъекции возможно изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10-14 суток. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии (сыпь, отек Квинке, анафилактический шок, кожный зуд, диспноэ) применение Элеовита прекращают и животному назначают антигистаминные средства и, при необходимости, симптоматическое лечение.

17. В случае быстрого парентерального введения или передозировки возможно развитие системных реакций (возбуждение, саливация, рвота, диарея, тахикардия, судороги).

18. Элеовит совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками, применяемыми в животноводстве.

19. Особенности действия препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

20. При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

21. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мясопродуктов и молока во время и после применения Элеовита разрешается без ограничений.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

ООО «НПК «Асконт+»,  
142279, Московская область,  
г. Серпухов, п. Оболенск,  
ул. Строителей, строение 2

Наименование, адрес  
организации, уполномоченной  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие  
претензий от потребителя

ООО «НПК «Асконт+»,  
142279, Московская область,  
г. Серпухов, п. Оболенск,  
ул. Строителей, строение 2