

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Эндометрамага-Био[®]
для лечения эндометритов у коров

(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эндометрамаг-Био[®] (Endometramag-Bio[®]).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: пропранола гидрохлорид и бензетония хлорид.

2. Лекарственная форма: раствор для внутриматочного применения. Лекарственный препарат в 1 мл в качестве действующих веществ содержит пропранолола гидрохлорида – 15 мг, бензетония хлорида - 0,75 мг, а также вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 0,3 мл, метилцеллюлозу - 1,5 мг, трилон – 1 мг и воду для инъекций – до 1 мл.

Эндометрамаг-Био[®] выпускают расфасованным по 0,5 и 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, которые закрывают резьбовыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год с даты производства.

Запрещается применение Эндометрамага-Био[®] по истечении срока годности.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

5. Эндометрамаг-Био[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Утилизация неиспользованного препарата производится в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Эндометрамаг-Био[®] относится к антисептическим препаратам.

Пропранол – действующее вещество Эндометрамага-Био[®] - усиливает сократительную способность миометрия матки, а бензетония хлорид оказывает бактерицидное действие в отношении грамположительных и

некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Бензетоний активен в отношении дрожжей и ряда грибов, а также некоторых внеклеточно расположенных вирусов. Препарат не оказывает прижигающего действия на слизистую оболочку матки и способствует регенерации эндометрия.

Компоненты препарата плохо всасываются через слизистую оболочку матки, что предотвращает их накопление в продуктах животноводства и молоке.

Эндометрамаг-Био[®] по степени воздействия на организм согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные). В рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не оказывает местно-раздражающего действия, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием.

III. Порядок применения

8. Эндометрамаг-Био[®] применяют для лечения эндометрита у коров и профилактики послеродовых акушерских заболеваний.

9. Лекарственный препарат нельзя применять при повышенной чувствительности животного к компонентам препарата.

10. Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Для лечения эндометрита препарат вводят внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ с интервалом 24-48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3-5 введений. При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

Для профилактики послеродовых акушерских болезней препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ после отделения последа, абортов или оказания помощи при осложненных и патологических родах.

11. Симптомы передозировки у коров не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести препарат как можно скорее.

14. При применении Эндометрамага-Био[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

15. Не допускается одновременное применение Эндометрамага-Био[®] с ксилазином, ксиланитом, рометаром, ромпуном.

16. Молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, после термической обработки может быть использовано для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Эндометрагом-Био® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эндометрагом-Био®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Мосагроген»; 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Инструкция разработана ЗАО «Мосагроген», 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации «ФГУ ВГНКИ». Регистрационное удостоверение выдано компании ЗАО «Мосагроген» (г. Москва).

Номер регистрационного удостоверения