

УТВЕРЖДАЮ
Комитет ветеринарного контроля
и надзора Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан



2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению лекарственного препарата

для ветеринарного применения

ЭНТЕРОЗОО®, гель

Регистрационный номер: РК-ВП-4-3077-15.

Торговое название препарата:

ЭНТЕРОЗОО®

Международное непатентованное или группировочное название:

Полиметилсилоксана полигидрат.

Химическое название:

Продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3- тетрагидрокси-1,3- диметилдисилоксана полигидрат.

Лекарственная форма:

Гель для приема внутрь.

Состав на 100 г препарата:

Полиметилсилоксана полигидрат – 100г.

Описание:

Влажная масса белого цвета, состоящая из желеобразных комочков разного размера, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

Энтеросорбирующее средство.

Фармакологические свойства:

ЭНТЕРОЗОО® - полимерное гелевидное кремнийорганическое соединение, имеет пористую структуру. ЭНТЕРОЗОО® обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, микотоксины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Препарат сорбирует так же некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина, липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. ЭНТЕРОЗОО® не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его моторику.

Фармакокинетика:

Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

Острые отравления, включая кормовые отравления с симптомами острой диареи

Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи вызванные солями тяжелых металлов, пестицидами и др.

Кормовые токсикоинфекции, включая поражения микотоксинами.

Кишечные инфекции различной этиологии; бактериальной, вирусной (включая ротавирусы), грибковые, вызванные простейшими с симптомами острой и хронической диареи.

Заболевания желудочно - кишечного тракта (энтериты, колиты, панкреатиты, холециститы и др.).

Повреждения кишечной микрофлоры (включая нарушения пищеварения связанные с приемом антибиотиков).

Хронические заболевания печени и почек, сопровождающиеся недостаточностью.

Аллергические заболевания.

Кожные заболевания.

ЭНТЕРОЗОО® можно применять так же и здоровым животным с целью улучшения производственных показателей. При этом доза будет составлять половину дозы от стандартной, для каждого вида животного.

ЭНТЕРОЗОО® позволяет повысить сопротивляемость организма к болезням и улучшить общее состояние организма животного.

Способ применения и дозы:

ЭНТЕРОЗОО® рекомендуется применять при первых признаках заболевания или отравления у животного. Препарат не имеет запаха и вкуса, поэтому животные принимают его хорошо. Вводится различными способами: непосредственно орально, вместе с кормом, в смеси с водой в ротовую полость или через питательный насос, зонд, шприц и т.д.

Стандартная дозировка по виду и весу животного:

Лошади и жеребята, крупный рогатый скот и телята, свиньи и поросята, овцы и ягнята, козы и козлята: 0,5 г на один кг веса животного два раза в день, задавать индивидуально, добавив необходимое количество воды или вводить в ротовую полость с помощью специальных приспособлений (питательный насос, зонд, резиновая бутылка и т.д.) или задавать с кормом.

Собаки и щенки: до 4 кг – ½ чайной ложки 2 раза в день; до 15 кг – одна чайная ложка 2 раза в день; 15-50 кг – одна чайная ложка с горкой 2 раза в день; более 50 кг – одна столовая ложка 2 раза в день, вводить непосредственно в ротовую полость, или задавать с кормом, или добавить небольшое количество воды и ввести в ротовую полость.

Кошки и котята: до 2 кг – ½ чайные ложки 2 раза в день; более 2 кг – одна чайная ложка 2 раза в день, вводить непосредственно в ротовую полость, или смешать с кормом, или смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость.

Экзотические (крупные птицы) и домашние птицы (взрослые птицы): Одна столовая ложка один раз в день, смешать с кормом или давать в чистом виде.

Экзотические (мелкие птицы) и домашние птицы (молодняк): одна чайная ложка один раз в день, предварительно размять комочки, смешать с кормом или давать в чистом виде.

Приблизительный эквивалент: одна чайная ложка равна 5 г, одна чайная ложка с горкой равна 10 г, одна столовая ложка равна 15 г.

Острые отравления с симптомами острой диареи:

Первая дозировка – 2 стандартные дозы, затем 1 стандартная доза после каждого опорожнения кишечника. После купирования диареи рекомендуется применять ЭНТЕРОЗОО® в течение 5 последующих дней в соответствии со стандартной дозой по виду и весу животного.

Тяжелые отравление и интоксикации с симптомами длительной диареи:

Первая дозировка – 2 стандартных дозы, затем 1 стандартная доза каждый час в течение 24 часов до полного исчезновения признаков отравления. Применение препарата ЭНТЕРОЗОО® не исключает возможности применения его с основными лекарственными средствами, в зависимости от тяжести и специфики (этиологии) отравления. Продолжительность лечения препаратом ЭНТЕРОЗОО® может достигать 10 – 14 дней.

Профилактическая детоксикация:

1 стандартная доза 2 раза в день в течение 10-14 дней.

Рекомендации по продолжительности лечения:

В случае острого отравления, ЭНТЕРОЗОО® рекомендуется давать в течение 3-5 дней.

В случае острого отравления (включая кормовое отравление), сопровождающегося аллергическими реакциями, заболеваниями ЖКТ, кишечных инфекций различной этиологии, хронических заболеваний печени и почек, аллергических и кожных заболеваний рекомендуемая продолжительность лечения ЭНТЕРОЗОО® составляет 2-3 недели, по схеме лечения назначенной ветеринарным врачом.

Побочные реакции:

Не наблюдались.

Применение у беременных и кормящих животных:

ЭНТЕРОЗОО® может применяться при беременности и у кормящих животных.

Передозировка:

Случаев передозировки не отмечалось. Животные, в том числе и молодняк, хорошо переносят ЭНТЕРОЗОО® даже в больших дозах.

Дополнительные сведения:

ЭНТЕРОЗОО® не содержит сахара, подсластителей, лактозы, глютена, жиров, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Препарат может использоваться с другими лекарственными средствами, при этом уменьшения всасывания лекарственных средств не наблюдалось.

Противопоказания:

Противопоказания к применению ЭНТЕРОЗОО® не выявлены.

Форма выпуска:

Гель для приема внутрь в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки по 100 г, 200 г, 1 кг или 5 кг. Каждый пакет вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Гель для приема внутрь в двойных мешках из полиэтиленовой пленки по 20 кг.

Условия хранения:

Хранить при температуре не ниже 4*С и не выше 30*С. Хранить в местах недоступных для детей. Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки. Беречь от замораживания.

Срок годности:

Использовать до даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта ветеринарного врача.

Производитель:

ООО «ТНК СИЛМА»

399851, Россия, Липецкая обл., г. Данков, ул. Л.Толстого, д. 32/2

Тел. / факс (495) 223-91-00, www.enterozoo.ru; E-mail: contact@enterosgel.ru

Заявитель:

ООО «ЭСФАРМ»

115573 Москва, ул. Шипиловская, д.50 корп. 1, стр.2

Тел. / факс (495) 223-91-00, www.enterozoo.ru; E-mail: contact@enterosgel.ru