

**УТВЕРЖДАЮ**  
Комитет ветеринарного контроля  
и надзора Министерства сельского хозяйства  
Республики Казахстан



2015 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

*по применению лекарственного препарата*

*для ветеринарного применения*

**ЭНТЕРОЗОО<sup>®</sup>, суспензия**

Регистрационный номер: РК-ВП-4-3077-15.

Торговое название препарата:

**ЭНТЕРОЗОО<sup>®</sup>**

Международное непатентованное или группировочное название:

*Полиметилсилоксана полигидрат.*

Химическое название:

*Продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3- тетрагидрокси-1,3- диметилдисилоксана полигидрат.*

Лекарственная форма:

*Суспензия для приема внутрь.*

Состав на 100 г препарата:

*Полиметилсилоксана полигидрат – 60 г, очищенная вода – 40 г.*

Описание:

*Неоднородная пастообразная масса от белого до почти белого цвета без запаха, возможно расслоение.*

Фармакотерапевтическая группа:

*Энтеросорбирующее средство.*

#### **Фармакологические свойства:**

ЭНТЕРОЗОО® - полимерное гелевидное кремнийорганическое соединение, имеет пористую структуру. ЭНТЕРОЗОО® обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, микотоксины, антигены, пищевые аллергены и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина, липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. ЭНТЕРОЗОО® не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его моторику.

#### **Фармакокинетика:**

Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменном виде.

#### **Показания к применению:**

Острые отравления, включая кормовые отравления с симптомами острой диареи

Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи вызванные солями тяжелых металлов, пестицидами и др.

Кормовые токсикоинфекции, включая поражения микотоксинами.

Кишечные инфекции различной этиологии; бактериальной, вирусной (включая ротавирусы), грибковые, вызванные простейшими с симптомами острой и хронической диареи.

Заболевания желудочно - кишечного тракта (энтериты, колиты, панкреатиты, холециститы и др.).

Повреждения кишечной микрофлоры (включая нарушения пищеварения связанные с приемом антибиотиков).

Хронические заболевания печени и почек, сопровождающиеся недостаточностью.

Аллергические заболевания.

Кожные заболевания.

ЭНТЕРОЗОО® можно применять так же и здоровым животным в профилактических целях. ЭНТЕРОЗОО® позволяет повысить сопротивляемость организма к болезням и улучшить общее состояние организма животного.

#### **Способ применения и дозы:**

ЭНТЕРОЗОО® рекомендуется применять при первых признаках заболевания или отравления у животного. Препарат не имеет запаха и вкуса, поэтому животные принимают его хорошо. Вводится различными способами: непосредственно орально, вместе с кормом, в смеси с водой в ротовую полость или через питательный насос, зонд, шприц и т.д.

### Стандартная доза

Доза для каждого конкретного вида животного устанавливается в зависимости от его вида, пола, возраста и физиологического состояния. Для удобства измерения дозировки указываются в столовой и чайной ложках.

### Приблизительный эквивалент

1 чайная ложка равна 5 г; 1 столовая ложка равна 15 г.

**Собаки и щенки:** до 4 кг – 1 чайная ложка 2 раза в день; до 15 кг – 2 чайные ложки 1-3 раза в день; 15-50 кг – 3 чайные ложки 2 раза в день; более 50 кг – 1 столовая и 1 чайная ложки 2 раза в день, ввести непосредственно в ротовую полость, смешать с кормом или намазать на лакомство, смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца.

**Кошки и котята:** до 2 кг – 1 чайная ложка 2 раза в день; более 2 кг – 2 чайные ложки 2 раза в день, ввести непосредственно в ротовую полость, смешать с кормом или намазать на лакомство, смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца.

**Кролики, морские свинки, хорьки, нутрии:** 1 чайная ложка 2 раза в день, смешать в поилке с водой или ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца, предварительно смешав с небольшим количеством воды.

**Хомяки, мыши, крысы:** ½ чайной ложки 2 раза в день, смешать в поилке с водой или ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца, предварительно смешав с небольшим количеством воды.

**Экзотические птицы:** 1 чайная ложка 2 раза в день, смешать в поилке с водой, или ввести непосредственно в ротовую полость, смешав с небольшим количеством воды.

### Острые отравления с симптомами острой диареи

Первая дозировка – 2 стандартные дозы, затем 1 стандартная доза после каждого опорожнения кишечника. После купирования диареи рекомендуется применять ЭНТЕРОЗОО® в течение 5 последующих дней в соответствии со стандартной дозой по виду и весу животного.

### Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи

Первая дозировка – 2 стандартных дозы, затем 1 стандартная доза каждый час в течение 24 часов до полного исчезновения признаков отравления. Применение препарата ЭНТЕРОЗОО® не исключает возможности применения его с основными лекарственными средствами, в зависимости от тяжести и специфики (этиологии) отравления. Продолжительность лечения препаратом ЭНТЕРОЗОО® может достигать 10 – 14 дней.

### Профилактическая детоксикация

1 стандартная доза 3 раза в день в течение 10-14 дней.

### **Рекомендации по продолжительности лечения:**

*В случае острого отравления рекомендуется давать ЭНТЕРОЗОО® в течение 3-5 дней.*

*В случае острого отравления (включая кормовое отравление), сопровождающегося аллергическими реакциями, заболеваниях ЖКТ, кишечных инфекций различной этиологии, хронических заболеваний печени и почек, аллергических и кожных заболеваний рекомендуемая продолжительность лечения ЭНТЕРОЗОО® составляет 2–3 недели, по схеме лечения назначенной ветеринарным врачом.*

### **Побочные реакции:**

Не наблюдались.

### **Применение у беременных и кормящих животных:**

*ЭНТЕРОЗОО® может применяться при беременности и у кормящих животных.*

### **Передозировка:**

*Случаев передозировки не отмечалось. Животные, в том числе и молодняк, хорошо переносят ЭНТЕРОЗОО® даже в больших дозах.*

### **Дополнительные сведения:**

*ЭНТЕРОЗОО® не содержит сахара, подсластителей, лактозы, глютена, жиров, красителей, ароматизаторов и консервантов.*

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

*Препарат может использоваться с другими лекарственными средствами, при этом уменьшения всасывания лекарственных средств не наблюдалось.*

### **Противопоказания:**

*Противопоказания к применению ЭНТЕРОЗОО® не выявлены.*

### **Форма выпуска:**

*Суспензия для приема внутрь в тубах из комбинированных материалов по 100 г или в пакетах из материала комбинированного многослойного на основе алюминиевой фольги и пленки по 15 г.*

*Каждую тубу или по 10 или по 15 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.*

### **Условия хранения:**

*Хранить при температуре не ниже 4<sup>0</sup>С и не выше 30<sup>0</sup>С. Хранить в местах, недоступных для детей. Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки. Беречь от замораживания.*

**Срок годности:**

*Использовать до даты, указанной на упаковке.*

**Условия отпуска:**

*Отпускают без рецепта ветеринарного врача.*

**Производитель:**

*ООО «ТНК СИЛМА»*

*399851, РФ, Липецкая обл., г. Данков, ул. Л. Толстого, д. 32/2*

*Тел./факс (495) 223-91-00, [www.enterozoo.ru](http://www.enterozoo.ru)*

*E-mail: [info@enterosgel.ru](mailto:info@enterosgel.ru)*

**Заявитель:**

*ООО «ЭСФАРМ»*

*115573 Москва, ул. Шипиловская, д.50, корп.1, стр.2*

*Тел./факс (495) 223-91-00, [www.enterozoo.ru](http://www.enterozoo.ru)*

*E-mail: [info@enterosgel.ru](mailto:info@enterosgel.ru)*