

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

23.07.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
ЭПРИФОРТ® 2%

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-12.26-5582 № ПРР-3-12.26/04202

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: ЭПРИФОРТ® 2% (Eprifort 2%);
международное непатентованное наименование: эприномектин.
2. Лекарственная форма: раствор для внутримышечного и подкожного введения.
Лекарственный препарат в 1 мл в качестве действующего вещества содержит эприномектин – 20 мг, а также вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, диметилсульфоксид и глицерин стабилизированный.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Запрещается применять по истечении срока годности.
4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 50 и 100 мл во флаконы из темного стекла, по 100 и 500 мл в полимерных флаконах соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми или алюмопластиковыми колпачками с контролем первого вскрытия. Флаконы по 50 и 100 мл индивидуально упаковывают в картонную пачку. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению препарата.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: противопаразитарные средства.
10. Эприномектин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром противопаразитарного действия в отношении имагинальных и личиночных форм нематод желудочно-кишечного тракта и легких, саркоптоидных клещей и личинок оводов, паразитирующих у животных.

Механизм противопаразитарной активности эприномектина заключается в селективном связывании с глутаматными рецепторами ионных каналов хлора, расположенных в клеточных мембранах нервных и мышечных клеток, в увеличении их проницаемости для ионов хлора и гиперполяризации мембран нервных и мышечных клеток, что приводит к нарушению проводимости нервных импульсов, параличу и гибели паразитов.

После парентерального введения препарата эприномектин резорбируется из места введения, длительно сохраняется в терапевтической концентрации в организме животных, обеспечивая паразитоцидное действие и защиту от повторного заражения в течение длительного периода (до 21 дня). Препарат выводится из организма главным образом с фекалиями и мочой, у лактирующих животных – частично с молоком.

ЭПРИФОРТ® 2% по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. ЭПРИФОРТ® 2% назначают лошадям и свиньям для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта и легких, личинками желудочно-кишечных оводов, вшами, саркоптоидными клещами.

Лошадям препарат применяют при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта: стронгилятозы (деляфондиоз, альфортиоз, стронгилез, трихонематозы), параскариоз, оксиуроз;
- саркоптоидными клещами: саркоптоз;
- личинками желудочно-кишечных оводов: гастерофилез.

Свиньям препарат применяют при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта: аскариоз, эзофагостомоз, трихоцефалез, стронгилоидоз;
- легочными нематодами: метастронгилез;
- вшами: гематопиноз;
- саркоптоидными клещами: саркоптоз.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), выраженные нарушения функции почек и печени. Не подлежат обработке истощенные и больные инфекционными болезнями животные.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом ЭПРИФОРТ® 2%.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Применение лекарственного препарата самкам в период беременности и вскармливания молодняка определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки соотношения пользы к возможному риску его применения.

15. ЭПРИФОРТ® 2% применяют животным однократно парентерально с соблюдением правил асептики в следующих дозах:

- лошадям – подкожно в дозе 1 мл на 100 кг массы животного (соответствует 200 мкг эприномектина на 1 кг массы);
- свиньям – внутримышечно в дозе 1 мл на 66 кг массы животного (соответствует 300 мкг эприномектина на 1 кг массы).

Дегельминтизацию животным проводят перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище, а также в иные сроки по показаниям; против личинок оводов – сразу после окончания лета оводов и весной, за 2-3 недели до начала выпадения личинок оводов на окукливание; против возбудителей арахноэнтомозов – по показаниям.

Каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (7-10 животных). При отсутствии осложнений в течение 3 суток приступают к обработке всего поголовья.

16. После применения препарата ЭПРИФОРТ® 2% возможно появление нежелательных реакций: часто (более 1%, но менее 10%) – беспокойство, встряхивание головой, подергивание хвостом, вокализация, чесание места инъекции; редко (более 0,01%, но менее 0,1%) – возбуждение, усиление саливации, учащение дефекации и мочеиспускания, атаксия; очень редко (менее 0,01%) – мышечный тремор и конвульсии. Эти симптомы проходят, как правило, спонтанно, не требуют применения лекарственных средств. При появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

В некоторых случаях через 24 часа после введения лекарственного препарата возможно образование отека и уплотнения в месте инъекции, которые обычно рассасываются самопроизвольно в течение 7 дней, однако уплотнение на месте инъекции может сохраниться более 21 дня. Отек может сопровождаться легкой или умеренной болью. Данная реакция проходит самостоятельно и не требует дополнительного лечения.

17. При передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться анорексия, диарея, слюнотечение, моторная дискоординация, угнетенное состояние, мидриаз, тремор мышц, конвульсии. В этих случаях животному назначают средства симптоматической терапии. Специфический антидот отсутствует.

18. Не следует применять препарат одновременно с другими противопаразитарными средствами, содержащими макроциклические лактоны, пиперазином и препаратами, ингибирующими холинэстеразу. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и известными кормовыми добавками отсутствуют. Препарат не следует смешивать в одном шприце с другими препаратами.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Лекарственный препарат применяют однократно. В тяжелых случаях заболевания животных саркоптоидозами препарат применяют двукратно с интервалом 14 дней.

21. Убой на мясо свиней и лошадей проводят не ранее чем через 30 суток после последнего введения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки. Нельзя использовать в пищевых целях молоко кобыл после применения препарата в связи с отсутствием исследований остаточных количеств эприномектина в молоке кобыл.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Телефон горячей линии: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор



С.В. Енгашев