

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Научно-внедренческий центр
Агроветзащита»



С.В. Енгашев

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Флайблок поверхность для борьбы с насекомыми и клещами
в животноводческих помещениях

(организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Флайблок поверхность (Flyblok surface) – инсектоакарицидное средство для защиты животных (и птиц) от насекомых и клещей в животноводческих помещениях.

2. Флайблок поверхность в качестве активного вещества содержит фипронил - 0,05%, в качестве вспомогательного вещества дистиллированную воду. По внешнему виду средство представляет собой опалесцирующую жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.

3. Выпускают Флайблок поверхность расфасованным в полиэтиленовые флаконы, укупоренные пластиковыми крышками с контролем первого вскрытия, в комплекте с распылительной насадкой; в полиэтиленовые канистры, с навинчиваемыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.

4. Хранят Флайблок поверхность в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5⁰С до 25⁰С. При хранении допускается образование осадка, легко исчезающего при встряхивании. Перед применением встряхнуть. Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

Запрещается использование Флайблок поверхность по истечении срока годности.

5. Флайблок поверхность следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованное средство с истекшим сроком годности утилизируют с бытовыми отходами.

II. Биологические свойства

7. Флайблок поверхность является инсектоакарицидным средством. Обладает выраженным контактным и кишечным действием. Активен против широкого спектра насекомых, таких как комары (Culicidae), мухи (Musca), блохи (Siphonaptera), вши (Anoplura), пухопероеды (Mallophaga), тараканы

(Blattoptera), муравьи (Formicidae), а также саркоптоидных (Sarcoptoidea), иксодовых (Ixodidae) и куриных (Dermanyssidae) клещей, как на личиночной, так и на взрослой стадии.

Входящий в состав средства фипронил поражает центральную нервную систему эктопаразитов. Механизм действия его основан на блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей. Является медленно действующим ядом, который позволяет отравленным насекомым возвратиться в колонию и принести с собой некоторое количество действующего вещества, что способствует распространению яда по всему гнездовью.

Флайблок поверхность по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает местно – раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсibiliзирующего действия. При попадании на слизистые оболочки вызывает слабое раздражение. Токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

8. Флайблок поверхность применяют для дезинсекции и деакаризации животноводческих помещений, свинокомплексов и птицефабрик (обработки стен, пола, занавесок, противокмаринных сеток, подстилок, на фермах, в конюшнях, в вольерах, при высокой численности и активности кровососущих насекомых и клещей, для защиты от насекомых, распространяющихся через грызунов) и других объектов ветнадзора.

9. Обработка помещений против насекомых средством Флайблок поверхность разрешена в присутствии животных.

Перед началом обработки молочное оборудование и инвентарь накрывают полиэтиленовой пленкой.

Обработке подвергают места локализации эктопаразитов (окна, стены, двери, оборудование, упорные балки и т.п.).

В летних лагерях насекомых уничтожают путем выборочного нанесения средства на внутренние и наружные стены, навесы, загоны и другие места их массового скопления.

10. Перед работой содержимое флакона встряхивают, с емкости снимают крышку и на ее место с помощью резьбового соединения закрепляют распылительную головку. Нажимая на рукоятку насоса, проводят обработку. Из одного полимерного флакона можно обработать 40 – 45 м² площади помещения.

Возможна обработка помещений с помощью ДУК, ранцевых опрыскивателей и т.п.

11. После обработки погибших насекомых и клещей сметают и уничтожают.

12. Повторные обработки помещений проводят по показаниям в зависимости от численности эктопаразитов, придерживаясь 12 – 14 дневного интервала.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе со средством Флайблок поверхность необходимо соблюдать «Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве».

Каждый работающий должен быть обеспечен и обязан пользоваться комплектом спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, фартук прорезиненный, сапоги резиновые, очки защитные противопылевые, респиратор марок Ф-62 (ШМ), «Астра-2», типа «Лепесток-40». «Лепесток-5»).

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы спецодежду необходимо снять, лицо и руки вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

14. При попадании средства на кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть струей воды или снять тампоном и затем смыть водой или слабощелочным раствором.

15. Запрещается использование пустой тары из-под средства для бытовых целей.

16. Организация-производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»; 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.