

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ  
10.07.2020



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Форвет®

(организация-разработчик ООО «Национальная Исследовательская Компания»,  
301404, Тульская обл., Суворовский р-н, д. Варушицы, д. 104)

Номер регистрационного удостоверения 50-3-1.15-2976№ПВР-3-9.9/02487

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Форвет® (Forvet®).

Группировочное название: полисахариды побегов Solanum tuberosum.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Форвет® в качестве действующего вещества содержит Панавир® (полисахариды побегов Solanum tuberosum) - 0,04 мг в 1 мл, а в качестве вспомогательных веществ: натрия хлорид, вода для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую, бесцветную или со светло-коричневым оттенком жидкость без запаха.

Срок годности - 5 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя.

Запрещается применение лекарственного препарата Форвет® по истечении срока годности.

4. Выпускают Форвет® расфасованным по 1 мл в ампулах из нейтрального стекла; по 5, 10, 20, 50 и 100 мл во флаконах из нейтрального стекла соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, с обкаткой алюминиевыми колпачками. 5 ампул по 1 мл или 5 флаконов по 5 мл укладывают в контурную ячею упаковку, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. При упаковке ампул дополнительно вкладывают нож ампульный или скарификатор ампульный керамический. При упаковке, в ампулы с нанесением цветной точки и надреза или цветного кольца излома на ампуле, скарификатор или нож ампульный не вкладывается. Флаконы по 5, 10, 20, 50, 100 мл по 1 штуке упаковывают в пачки из картона. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Форвет® в закрытой упаковке производителя отдельно от продуктов питания и кормов, защищённом от света месте, при температуре от 4 °С до 25 °С.

6. Форвет® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства.

9. Фармакотерапевтическая группа – иммуномодулирующий лекарственный препарат.

Панавир® – очищенный экстракт побегов растения Solanum tuberosum –

полисахаридный комплекс класса гексозных гликозидов, в состав которого входят: рамноза (2-10 %), арабиноза (3-15 %), глюкоза (10-67 %), галактоза (2-27 %), ксилоза (0,1-3 %), манноза (0,1-5 %), а также уроновые кислоты (2-5 %).

10. Обладает цитопротективным действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит репликацию вирусов в клетках, что приводит к существенному снижению инфекционной активности вирусов и повышению жизнеспособности инфицированных клеток.

Применение лекарственного препарата Форвет® повышает устойчивость животных к возбудителям инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, неблагоприятным факторам внешней среды, активизирует обменные процессы и клеточный иммунитет, повышает неспецифическую резистентность организма животных.

Форвет® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, мутагенного, канцерогенного и эмбриотропного действия.

### III. Порядок применения.

11. Форвет® назначают телятам и пороссятам в целях профилактики и комплексной терапии желудочно-кишечных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, собакам и кошкам – при вирусных инфекциях, включая чуму плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, аденовирусные инфекции, собакам – при осложненных формах атопического дерматита (в комплексной терапии), кошкам – при дерматомикозах, панлейкопении (в комплексной терапии).

12. Форвет® противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности животных к любому из компонентов, входящих в состав лекарственного препарата.

13. При работе с лекарственным препаратом Форвет® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой. Пустая тара из-под лекарственного препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Форвет®.

При случайном контакте лекарственного средства с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Форвет® не рекомендуется применять беременным самкам, в период лактации и у потомства животных.

15. С профилактической целью Форвет® применяют животным двукратно с интервалом 24-48 часов, в следующих разовых дозах (мл на животное):

- телятам и пороссятам массой более 5 кг – 5 мл, пороссятам массой менее 5 кг – 2,5 мл; подкожно;

- кошкам и собакам массой менее 5 кг – 2,5 мл, животным массой более 5 кг – 5 мл; внутривенно или подкожно.

С лечебной целью Форвет® применяют животным в комплексной терапии подкожно или внутривенно в следующих разовых дозах:

- телятам и пороссятам при желудочно-кишечных заболеваниях вирусной и бактериальной этиологии двукратно с интервалом 24 часа – 5 мл на животное, пороссятам массой менее 5 кг – 2,5 мл на животное;

- собакам при чуме плотоядных и инфекционном гепатите двукратно с интервалом 48 часов: животным массой менее 5 кг – 2,5 мл, животным массой более 5 кг – 5 мл;
- собакам при аденовируозе и парвовирусном энтерите – 1 мл на 2,5 кг массы один раз в сутки в течение 7-10 дней подряд;
- собакам при осложненных формах атопического дерматита – подкожно из расчета 1 мл на 10 кг массы, один раз в сутки в течение 5-7 дней;
- кошкам при ротавирусном энтерите, герпесвирусном ринотрахеите и кальцивирусной инфекции – 1 мл на 5 кг массы один раз в сутки в течение 7-10 дней подряд;
- кошкам при дерматомикозах – подкожно из расчета 1 мл на 10 кг массы, один раз в сутки в течение 7 дней подряд;
- кошкам при панлейкопении – внутривенно или подкожно из расчета 1 мл на 10 кг массы, один раз в сутки в течение 5-7 дней.

Продолжительность курса лечения определяет лечащий ветеринарный врач, в зависимости от тяжести клинического состояния животного.

16. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают антигистаминные препараты.

При появлении каких-либо нежелательных побочных эффектов необходимо прекратить введение препарата и проконсультироваться с ветеринарным врачом.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата Форвет® не выявлены.

18. Применение лекарственного препарата Форвет® не исключает использования других лекарственных препаратов и (или) кормов.

19. Особенности действия при первом приеме препарата или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при применении лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства после применения лекарственного препарата Форвет® используют без ограничений. Сроки использования продукции животноводства в случае применения Форвет® в лечебных целях определяются в соответствии с рекомендованными для лекарственных препаратов, применяемых одновременно с Форвет® в составе комплексной терапии.

Наименования и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения ООО «АВЗ С-П», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

ООО «Фарма Ген», 194064, Россия, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, д. 4, литер А.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения на принятие претензий от потребителя ООО «Национальная Исследовательская Компания», 301404, Тульская область, Суворовский р-н, д. Варушицы, д. 104, тел.: 8-800-555-222-9.

Генеральный директор  
ООО «Национальная Исследовательская Компания»



В.В. Арсенков