

12.03.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
ГЕПАВЕТАРИУМ®

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр.2)

Номер регистрационного удостоверения 77-3-04.26-54471/ПВР-3-04.26/04171

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – ГЕПАВЕТАРИУМ® (GERAVETARIUM®);
международное непатентованное наименование – адеметионин.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения.

Лекарственный препарат выпускают в дозировках 100 мг, 400 мг.

Флакон с лиофилизатом содержит:

Действующее вещество: адеметионина 1,4-бутандисульфат 190 мг, 760 мг, что эквивалентно 100 мг, 400 мг адеметионина соответственно.

Ампула с растворителем содержит:

Вспомогательные вещества: L – лизин, натрия гидроксид и воду для инъекций.

3. По внешнему виду лиофилизат представляет собой лиофилизированную массу белого или белого с желтоватым оттенком цвета, уплотненную в таблетку; растворитель – прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость с характерным запахом.

Срок годности лиофилизата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, растворителя – 3 года. После вскрытия флакона или ампулы препарат хранению не подлежит. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают лиофилизат расфасованным по 100 мг или 400 мг в стеклянные флаконы вместимостью 10 мл, укупоренные стерильными резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками с пластмассовой крышкой контроля первого вскрытия или без пластмассовой крышки; растворитель – по 5 мл в стеклянные ампулы. Пять флаконов с лиофилизатом и пять ампул с растворителем упаковывают в одну контурную ячейковую упаковку из 10 ячеек или две из 5 ячеек, с дальнейшим помещением в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. ГЕПАВЕТАРИУМ® хранят в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта (требования) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа – гепатопротекторы.

10. Адеметионин, входящий в препарат, оказывает холеретическое и холекинетическое действие, обладает детоксикационными, регенерирующими, антиоксидантными, антифиброзирующими и нейропротективными свойствами.

Лекарственный препарат восполняет дефицит адеметионина и стимулирует его выработку в организме, в первую очередь в печени и мозге. Принимает участие в важных биохимических реакциях: трансметилировании, транссульфурировании, трансаминировании. В реакциях трансметилирования адеметионин донирует метильную группу для синтеза фосфолипидов клеточных мембран, нейротрансмиттеров, нуклеиновых кислот, белков, гормонов. В реакциях транссульфатирования адеметионин является предшественником цистеина, таурина, глутатиона (обеспечивая окислительно-восстановительный механизм клеточной детоксикации), коэнзима А (включается в биохимические реакции цикла трикарбоновых кислот и восполняет энергетический потенциал клетки).

Повышает содержание глутамина в печени, цистеина и таурина в плазме; снижает содержание метионина в сыворотке, нормализуя метаболические реакции в печени. После декарбоксилирования участвует в реакциях аминопропилирования, как предшественник полиаминов — путресцина (стимулятор регенерации клеток и пролиферации гепатоцитов), спермидина и спермина, входящих в структуру рибосом, что уменьшает риск фиброзирования. Оказывает холеретическое действие.

Адеметионин нормализует синтез эндогенного фосфатидилхолина в гепатоцитах, что повышает текучесть и поляризацию мембран. Это улучшает функцию ассоциированных с мембранами гепатоцитов транспортных систем желчных кислот и способствует пассажу желчных кислот в желчевыводящую систему. Эффективен при внутрипеченочном (внутридольковом и междольковом) варианте холестаза (нарушение синтеза и тока желчи). Адеметионин снижает токсичность желчных кислот в гепатоците, осуществляя их конъюгирование и сульфатирование. Конъюгация с таурином повышает растворимость желчных кислот и выведение их из гепатоцита. Процесс сульфатирования желчных кислот способствует возможности их элиминации почками, облегчает прохождение через мембрану гепатоцита и выведение с желчью. Кроме этого, сами сульфатированные желчные кислоты дополнительно защищают мембраны клеток печени от токсического действия несulfатированных желчных кислот (в высоких концентрациях присутствующих в гепатоцитах при внутрипеченочном холестазе).

Биодоступность при внутримышечном введении – 95 %. Связывание с белками плазмы – незначительное, проникает через гематоэнцефалический барьер. Независимо от пути введения отмечается значительное увеличение концентрации

адеметионина в спинномозговой жидкости. Метаболизируется в печени. Период полувыведения – 1,5 ч. Выводится почками.

ГЕПАВЕТАРИУМ® по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. ГЕПАВЕТАРИУМ® применяют собакам и кошкам с лечебной и лечебно-профилактической целью в составе комплексной терапии при хроническом некалькулезном холецистите, холангите, внутрипеченочном холестазае, гепатитах различного генеза (вирусные, токсические), жировой дистрофии печени, а также для снижения отрицательного влияния лекарственных средств, обладающих гепатотоксичностью.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применять щенкам и котят до трех месяцев.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Возможность применения лекарственного препарата беременным и кормящим самкам определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

15. Лекарственный препарат применяют собакам и кошкам, начиная с 3-х месячного возраста. Препарат вводят внутривенно или внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 20 мг/кг по действующему веществу, что соответствует 0,25 мл/ кг массы животного. Курс лечения составляет 7-14 дней.

Перед применением лиофилизат нужно растворить в специально прилагаемом растворителе непосредственно перед введением. Для этого стерильным шприцем набирают растворитель и с соблюдением правил асептики вводят во флакон с лиофилизатом. Для дозировки 100 мг следует отобрать 1,25 мл растворителя, для дозировки 400 мг следует использовать полностью весь растворитель из ампулы. Остаток препарата должен быть утилизирован. Для внутривенного введения соответствующую дозу разведенного препарата следует растворить в физиологическом растворе или 5 % растворе глюкозы из расчета 10 мл/кг веса животного и ввести очень медленно.

В случае если лиофилизат имеет цвет, отличный от белого до белого с желтоватым оттенком цвета (вследствие трещины во флаконе или воздействия тепла) препарат использовать не рекомендуется.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией

побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки при применении препарата не выявлены.

18. Не следует смешивать препарат со щелочными растворами и растворами, содержащими ионы кальция. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и известными кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ФКП «Армавирская биофабрика», Россия, 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11.

Наименование, адрес и телефон организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Телефон горячей линии: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).
Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор



С.В. Енгашев