

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Гестренол® капли для кошек и котов
для регуляции половой охоты у кошек и котов

(организация-разработчик ООО «НВП «Астрафарм» г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Гестренол® капли для кошек и котов (Gestrenol guttae).

Международное непатентованное наименование: пропионат мепрегенола и этинилэстрadiол.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат Гестренол® капли для кошек и котов в качестве действующих веществ в 1 мл содержит:

- для кошек: пропионат мепрегенола – 1,50 мг и этинилэстрadiол 0,015 мг; в качестве вспомогательных веществ: соевое масло – 925 мг, вкусовую добавку - эфирное масло мяты – 1,50 мг.

- для котов: пропионат мепрегенола – 4,00 мг и этинилэстрadiол 0,20 мг; в качестве вспомогательных веществ: соевое масло – 925 мг, вкусовую добавку - эфирное масло мяты – 1,50 мг.

По внешнему виду препарат представляет собой раствор от желтого до желто-зеленого цвета.

3. Гестренол® капли для кошек и котов выпускают расфасованным по 1; 1,5; 2; 3 и 5 мл в полимерные флаконы с насадками-дозаторами, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия. Препарат во флаконах индивидуально упаковывают в блистер и помещают в картонную коробку с инструкцией по применению.

4. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C. Во время транспортировки допускается кратковременное замораживание препарата, после оттаивания он не теряет своих характеристик.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства. Запрещается применение лекарственного препарата Гестренол® капли для кошек и котов по истечении срока годности.

5. Гестренол® капли для кошек и котов следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Гестренол® капли для кошек и котов – гормональный контрацептивный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты у кошек и котов.

Входящий в состав лекарственного средства гестаген - пропионат мепрегенола блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберины (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий рилизинг гормоны), которые являются пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за развитие в яичниках фолликулов и их овуляцию у кошек, а у котов за снижение уровня тестостерона в крови, угнетение половых рефлексов и сперматогенез. Этинилэстрадиол в комплексе с пропионатом мепрегенолом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды у кошек, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Пропионат мепрегенола и этинилэстрадиол быстро всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

Препарат по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендованных дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

8. Препарат применяют кошкам для угнетения полового возбуждения (прерывания и задержки течки), предотвращения нежелательной беременности, котам - для угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории.

9. Препарат противопоказан беременным и кормящим кошкам, животным не достигшим половой зрелости, при новообразованиях молочной железы, половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

10. Препарат вводят перорально, капая в рот, на нос или на лакомство. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу):

Таблица

Вид животного	Назначение лекарственного препарата		Масса тела животного	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Кошки	Угнетение полового возбуждения		До 5 кг	4 капли	3 – 5 дней	При первых признаках начала течки	1. Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала течки прошло более 2-х дней. 2. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения половой охоты. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного добавить еще один день курсового приема. 4. Курс прерывания течки рекомендуется применять не более 2-х раз в год.
	Прерывание течки		6 – 10 кг	5 – 8 капель			

		Задержка течки, поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли	1 раз в неделю	В период полового покоя, между течками	1. Может проводиться 18 месяцев подряд. 2. Повторный курс возможен после возобновления течки.
	Предотвращение нежелательной беременности		Независимо от массы тела животного	8 капель	Двукратно с интервалом 24 часа	не позднее 24 часов после случайного спаривания	Более поздний срок дачи лекарственного препарата значительно снижает эффект воздействия.
Коты	Угнетение полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории	Прерывание полового возбуждения	До 5 кг	4 капли	3 – 5 дней	При первых признаках полового возбуждения	1. Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала полового возбуждения прошло более 2-х дней 2. Молодым котам в первый день курса назначают 8 капель, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного добавить еще один день курсового приема. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
			6 – 10 кг	5 – 8 капель			
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли	1 раз в неделю	В период полового покоя		

Через 2 – 3 месяца после отмены препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особеностей действия препарата Гестренол® капли для кошек и котов при первом применении или при отмене не установлено.

13. Следует избегать пропусков очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Гестренол® капли для кошек и котов в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

15. Несовместимости с различными группами лекарственных препаратов не выявлено.

16. Препарат Гестренол® капли для кошек и котов не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с лекарственным препаратом Гестренол® капли для кошек и котов следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Гестренол® капли для кошек и котов. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель:

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

ООО «НПК «СКиФФ» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Адрес производства:

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

ООО «НПК «СКиФФ» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Инструкция разработана ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Гестренол капли, утвержденная Россельхознадзором 7 февраля 2012 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения