

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

07 июля 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Инсектал шампунь

(организация-разработчик: Neoterica GmbH / Неотерика ГмбХ
Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: *276-3-14.23-50055/ПВР-3-14.23/05985*

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Инсектал шампунь (Insektal shampoo);
международные непатентованные наименования действующих веществ: фипронил, пирипроксифен.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инсектал шампунь в 1 мл в качестве действующих веществ содержит фипронил - 2,08 мг и пирипроксифен - 1,04 мг, а в качестве вспомогательных веществ: лауретсульфат натрия, гидрогенизированное касторовое масло, кокамидопропилбетаин, диметилсульфоксид, диэтаноламид кокосового масла, натрия хлорид, поликватерниум – 7, отдушку Алоэ Вера, декспантенол, экстракт сухой Алоэ Вера, полуформаль бензилового спирта, Трилон Б, лимонную кислоту, воду питьевую.

3. По внешнему виду препарат представляет собой густую прозрачную жидкость желтоватого цвета с характерным запахом.

Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия – 2 месяца.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Инсектал шампунь выпускают расфасованными по 200 мл в полимерные флаконы, укупоренные пластмассовыми крышками диск-топ. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в

соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Инсектал шампунь относится к фармакотерапевтической группе инсектоакарицидные средства в комбинациях.

10. Комбинация фипронила и пирипроксифена, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр его контактного инсектоакарицидного действия на половозрелые и неполовозрелые (личинки) фазы развития блох (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), иксодовых клещей (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), саркоптоидных клещей (*Sarcoptes scabiei*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Psoroptes* spp.), паразитирующих на собаках и кошках.

Фипронил – инсектоакарицид группы фенилпиразолов, механизм действия которого заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов у членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

Пирипроксифен – аналог природного ювенильного гормона, регулирующего рост и развитие насекомых. Механизм его действия заключается в нарушении процессов синтеза хитина и линьки личинок, что препятствует развитию полноценных куколок, вызывая гибель на преимагинальных фазах развития, прекращает появление половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания.

Действующие вещества препарата при его применении распределяются по кожно-волосному покрову животного, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывают длительное контактное инсектоакарицидное действие.

Инсектал шампунь по степени воздействия на организм животных относятся к веществам «малоопасные» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах препарат не оказывают резорбтивно-токсического, кожно-раздражающего и сенсibiliзирующего действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение; токсичен для кроликов, рыб и пчел.

III. Порядок применения

11. Инсектал шампунь назначают собакам и кошкам для борьбы с эктопаразитами (блохи, вши, власоеды, иксодовые клещи).

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Препарат не следует применять ослабленным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также животным массой тела менее 1 кг. Не следует допускать попадания лекарственного препарата внутрь и на слизистую оболочку глаз животных.

13. При работе с Инсектал шампунем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, использовать резиновые перчатки. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей воды.

В течение 24 часов после обработки лекарственным препаратом животное не рекомендуется гладить. В течение 48 часов после обработки животное не следует купать в открытых водоемах и подпускать к маленьким детям.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Инсектал шампунем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не следует применять щенкам и котятм моложе 7-недельного возраста, беременным и кормящим самкам.

15. Перед применением кожно-шерстный покров животного обильно смачивают теплой водой, затем наносят Инсектал шампунь в дозе от 0,5 до 1 мл на 1 кг массы тела животного, в зависимости от густоты и длины шерсти, равномерно распределяют по всей поверхности тела, слегка втирают до образования пены, избегая попадания на слизистые оболочки и предотвращая слизывание лекарственного препарата животным. Через 5-7 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают.

С целью уничтожения иксодовых клещей, блох, вшей и власоедов обработку животных проводят однократно.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Инсектал шампуня в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, признаки раздражения кожи), обработки прекращают и препарат смывают водой с моющим средством.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Инсектал шампунь не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. Инсектал шампунь не предназначен для применения продуктивным животным.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование производственной производителя препарата для применения. | и адрес площадки лекарственного ветеринарного | АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23 |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| Наименование, уполномоченной владелец удостоверения препарата на потребителя. | адрес организации, держателем или регистратора лекарственного претензий от | АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263 |
|--|--|---|

Генеральный директор
Neoterica GmbH, Германия


NEOTERICA GmbH В.В. Тарабрин
Grillostrasse 18 45141
Essen, Deutschland