

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
Н.А. ВЛАСОВ
18.12.2019

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Инспектор спрей

(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany /
Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-6.15-3785№ПВИ-3-6.15/04612

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Инспектор спрей (Inspector spray).
международное непатентованное наименование: фипронил, моксидектин,
пирипроксифен.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инспектор спрей в качестве действующих веществ содержит фипронил – 0,4%,
пирипроксифен – 0,2%, моксидектин – 0,1%, а в качестве вспомогательных веществ
полиэтиленгликоль (ПЭГ 400), хвойная отдушка (PINE 917), твин-80, спирт
изопропиловый.

3. Препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня
производства. Хранить препарат после вскрытия флакона до окончания срока
годности.

Инспектор спрей по истечении срока годности не должен применяться.

4. Инспектор спрей выпускают расфасованным по 100, 150 и 200 мл в
полимерные флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемыми
пластмассовыми крышками, снабженными насадками-дозаторами, упакованные
поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в
сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых
продуктов и кормов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при
температуре от минус 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более
60%.

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с
требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Инспектор спрей относится к фармакотерапевтической группе: противопаразитарные средства в комбинациях.

10. Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают его широкий спектр противопаразитарного действия в отношении блох (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalide canis*), вшей (*Linognathus setosus*), влосоедов (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), саркоптоидных (*Sarcoptes scabiei*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*), демодекозных (*Demodex canis*) и иксодовых (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.) клещей, личиночных и половозрелых фаз развития нематод, включая *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonine*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Angiostrongylus vasorum*, *Crenosoma vulpis*, и личинок L3 и L4 (микрофилярий) *Dirofilaria immitis*, паразитирующих у собак и кошек.

Фипронил – инсектоакарицид группы фенилпиразолов, механизм его действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

Пирипроксифен – аналог природного ювенильного гормона, регулирующего рост и развитие насекомых. Механизм его действия заключается в нарушении процессов синтеза хитина и линьки личинок, что препятствует развитию полноценных куколок, вызывая гибель насекомых на преимагинальных фазах развития, прекращает восполнение популяции на стадии яйца и личинки и появление половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания.

Моксидектин – полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические лактоны), оказывая стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод.

После нанесения препарата на кожу фипронил и пирипроксифен, практически не всасываясь, быстро распределяются по поверхности тела и, удерживаясь на эпидермисе и шерсти, оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие. Моксидектин частично всасываясь через кожу, поступает в системный кровоток, органы и ткани, из организма выводится в основном в неизменном виде с фекалиями.

Продолжительность защитного действия после обработки животного сохраняется: против насекомых – до 3 месяцев, против клещей – до 1 месяца.

Инспектор спрей по степени воздействия на организм при однократном нанесении на кожу относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местнораздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммунотоксического действия, хорошо переносится животными разных пород. Препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Инспектор спрей применяют собакам и щенкам, кошкам и котятм старше 7-недельного возраста для лечения и профилактики энтомозов (блохи, вши, влосоеды), акарозов (вызываемых иксодовыми клещами, демодекоза, отодектоза, саркоптоза,

нотоздроза), кишечных нематодозов (токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза, трихоцефалеза), а также в целях профилактики дирофиляриоза.

12. Противопоказанием к применению Инспектор спрея является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и ослабленные собаки, кошки и животные других видов. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки. Обработку собак и кошек массой менее 1 кг следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

13. При работе с Инспектор спреем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. Обработку животного производить, используя резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. В течение 24 часов после обработки лекарственным препаратом животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Инспектор спреем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не подлежат обработке беременные и кормящие самки, котята и щенки моложе 7-недельного возраста.

15. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня, предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.

Для предотвращения слизывания препарата после обработки животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы.

Перед использованием флакон с препаратом встряхивают, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, направляя факел аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-25 см.

Доза препарата в зависимости от состояния шерстного покрова составляет 1,5-3,0 мл на 1 кг массы животного. Одно нажатие на распылительную головку обеспечивает дозу препарата, равную 0,75-0,8 мл.

Для уничтожения вшей, блох, власоедов и предотвращения прикрепления иксодовых клещей, спреем обрабатывают все тело животного против роста шерсти, слегка увлажняя ее (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) препарат слегка втирают вокруг глаз и носа. Повторные обработки проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат наносят на клеща и место его прикрепления к коже (одно нажатие на распылительную головку). Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают пинцетом и уничтожают.

При поражении животных саркоптозом, нотоэдрозом или демодексом препарат наносят на предварительно очищенные от струпьев пораженные участки тела с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см, из расчета 1 мл на 10 см² пораженного участка тела животного, что достигается, примерно, 2 нажатиями на распылительную головку. Обработку проводят два-четыре раза с интервалом 7-10 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований. Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом 1 день, нанося препарат на пораженные места сначала одной, а затем другой половины тела. Лечение животных рекомендуется проводить комплексно с применением патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

При отодектозе животных наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок, затем, направляя факел аэрозоля на внутреннюю поверхность ушной раковины, осуществляют одно-два (в зависимости от размера животного) нажатия на распылительную головку, после этого складывают ушную раковину вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Обрабатывают обязательно оба уха, даже в случае поражения отодектозом только одного уха. При отодектозе, осложненном отитом, назначают антибактериальные и противовоспалительные средства в соответствии с инструкциями по их применению.

При нематодозах желудочно-кишечного тракта препаратом обрабатывают все тело животного против роста шерсти, сильно увлажняя ее, нанося раствор непосредственно на кожу, длинную шерсть приподнимают рукой. Обработки необходимо проводить двукратно с интервалом 7-10 дней.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют весенне – летне – осенний период: перед началом лета комаров и москитов (переносчиков возбудителя) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне не ранее, чем за 1 месяц после завершения лета насекомых. Препарат не воздействует на половозрелых дирофилярий, а уничтожает циркулирующих в крови микрофилярий, и может быть применен без опасений животным, инвазированным половозрелыми дирофиляриями.

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, до полного высыхания шерстного покрова после обработки не следует позволять животным слизывать препарат, допускать их к открытому огню и нагревательным приборам. В течение 24 часов после обработки животное не следует мыть, купать и подпускать к маленьким детям.

В целях уничтожения эктопаразитов в помещении и предотвращения повторной инфекации животных подстилки и попоны обрабатывают препаратом из расчета 10-12 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности (примерно, 20-24 нажатия на распылительную головку флакона). В течение 2 дней не допускают контакта животного с обработанными предметами, а перед последующим использованием их моют (стирают) с моющим средством.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Инспектор спрей в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата

животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке у животного может наблюдаться угнетение, избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять Инспектор спрей одновременно с другими противопаразитарными препаратами, в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инспектор спрея, согласованная Россельхознадзором 23.07.2019 г.

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Наименование производственных производителя препарата | и площадок лекарственного | адрес АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23. |
|--|---------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от пользователя | АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263. |
|---|---|