

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

17 МАЙ 2022

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Катобевит[®]
(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501
Ново место, Словения/«KRKA, d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenija)

Номер регистрационного удостоверения: 405-3-9.22-4883N17B0-3-9.22/05965

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Катобевит[®] (Catobevit[®]).

Международное непатентованное наименование: бутафосфан и цианокобаламин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Катобевит[®] в 1 мл в качестве действующих веществ содержит бутафосфан - 100 мг, цианокобаламин - 0,05 мг, а также вспомогательные вещества: фенол, гидроксид натрия и воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от розового до красно-розового цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства, после вскрытия флакона - в течение 28 суток.

Запрещается применение препарата Катобевит[®] по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным в флаконы из темного стекла по 100 мл или 250 мл, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы поштучно упакованы в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Катобевит[®] в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Катобевит[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Катобевит® относится к комплексным препаратам, предназначенных для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности.

10. Катобевит® обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных.

Входящий в состав препарата бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует преобразование АДФ в АТФ, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани. Витамин В₁₂ активизирует процессы кроветворения, синтеза нуклеиновых кислот, восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

Катобевит® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

III. Порядок применения

11. Катобевит® назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии;
- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния;
- при родах, а также в целях профилактики послеродовых осложнений (тетания, родильный парез);
- при тяжелых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2 - 3 дня до соревнований).

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата Катобевит[®] является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с лекарственным препаратом Катобевит[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Катобевит[®]. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Лекарственный препарат Катобевит[®] разрешён к применению беременным и лактирующим животным.

15. Катобевит[®] применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), в дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Доза (мл на животное)
Взрослые лошади и крупный рогатый скот	10,0-25,0
Жеребята, телята	5,0-12,0
Взрослые овцы и козы	2,5-8,0
Ягнята, козлята	1,5-2,5
Взрослые свиньи	2,5-10,0
Поросята-сосуны, подсвинки	1,0-2,5
Собаки	0,5-5,0
Кошки, пушные звери	0,5-2,5

При хроническом течении болезни назначают $\frac{1}{2}$ дозы препарата Катобевит[®], указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5- 14 дней.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Катобевит[®] в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

17. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

18. Информация о взаимодействии препарата Катобевит® с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередного применения лекарственного препарата Катобевит® так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы использование препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Использование продукции животноводства во время и после применения препарата «Катобевит®» в пищевых целях разрешается без ограничений.

Наименования и адреса производственных площадок производителя препарата

АО «КРКА, д.д., Ново место»/«KRKA, d.d., Novo mesto»

1. Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija;

2. Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenija.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «КРКА-РУС», 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1
Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91.

Представитель АО «КРКА, д.д., Ново место»



А.А. Юламанова