

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей
для регуляции половой охоты у котов и кобелей
(организация-разработчик ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей (ContrSex Neo guttae pro cattorum et canum masculinum).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: бутират мепрегенола, этинилэстрadiол.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей в качестве действующих веществ в 1 мл содержит ацетобумедон (бутират мепрегенола) – 5,0 мг и этинилэстрadiол – 0,2 мг, в качестве вспомогательного вещества масло соевое.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года со дня производства.

Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей выпускают расфасованным по 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 мл в полиэтиленовые флаконы с насадками-дозаторами, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон с препаратом упаковывают поштучно в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей относятся к фармакологической группе: гормоны и их антагонисты.

10. Входящий в состав лекарственного средства гестаген – ацетобумедон – блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберин который является пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за сперматогенез и секрецию тестостерона. Эстроген – этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает успокаивающий эффект.

Ацетобумедон и этинилэстрадиол хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей применяют для регуляции половой охоты и связанного с ней нежелательного поведения (агрессивности, мечения территории, повышенной возбудимости) у котов и кобелей.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей являются заболевания половых органов, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Препарат вводят перорально, капая в рот, на нос или на лакомство. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Через 2 – 3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

Таблица 1.

Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Коты	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	До 5 кг	4 капли	3-5 дней	При появлении первых признаков половой охоты	1.Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым котам в первый день курса назначают 2 таблетки, далее по схеме. 3.Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного добавить еще один день курсового приема. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
			5,1-10 кг	4-8 капель			
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо массы тела животного		4 капли	1 раз в 10-14 дней	В период полового покоя	
Кобели	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	до 5 кг 5,1-10 кг 10,1-30 кг свыше 30 кг	2 капли 2-4 капли 4-12 капель 12+2 капли на каждые последующие 5 кг массы тела	2 раза в день, с интервалом 12 ч в течение 5-7 дней	При появлении первых признаков половой охоты	1.Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную дозу единовременно, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного добавить еще один день курсового приема. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

16. Запрещается применение лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей, животным, не достигшим половой зрелости.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение лекарственного препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом КонтрСекс Neo® капли для котов и кобелей. Пустую тару, из-под лекарственного препарата, запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

1. ООО «НПК «СКИФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата КонтрСекс Neo капли для котов и кобелей, утвержденная Россельхознадзором 7 февраля 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-11.15-2896 № ПВР-3-6.0/02597