

01.04.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей

(организация-разработчик ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва
Научный проезд, дом 20, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 35)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-11.15-3931№ПВР-3-6.0/02598

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей
(ContrSex Neo tabulettae pro cattorum et canum masculorum).

международное непатентованное наименование действующих веществ:
бутират мепрегенола и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 100 мг содержат: ацетобумедон (бутират мепрегенола) - 0,500 мг и этинилэстрадиол – 0,020 мг.

В качестве вспомогательных веществ КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей содержат: лактозу, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат, краситель пищевой.

3. По внешнему виду КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей представляют собой таблетки овальной формы, светло-желтого или кремового цвета, с логотипом «Нео» с одной стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей выпускают расфасованными по 5 таблеток в блистере. 2 блистера по 5 таблеток помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей – бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – ацетобумедон и эстроген – этинилэстрадиол.

Ацетобумедон блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберин, который является пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за секрецию тестостерона, угнетение половых рефлексов и сперматогенез.

Этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает успокаивающий эффект.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей применяют:

- котам для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории, а также для поддержания успокаивающего эффекта;

- кобелям для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения.

12. Препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, при заболеваниях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов.

13. При применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу, его необходимо смыть водой с мылом. В случае проявления аллергических реакций

и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение лекарственного препарата КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей до достижения животными половозрелого возраста запрещено.

15. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1):

Таблица 1.

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Примечания
Коты	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории	До 5 кг 5,1-10 кг	1 таблетка 1-2 таблетки	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Молодым котам в первый день курса назначают 2 таблетки, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день.
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 10-14 дней	1. Начало приема - в период полового покоя. 2. Может проводиться без перерывов.
Кобели	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения	до 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 5-7 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную дозу одновременно, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день.
		5,1-10 кг	1-2 таблетки		
		10,1-30 кг	2-4 таблетки		
		свыше 30 кг	4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела		

Через 2 – 3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo[®] таблетки для котов и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенностей действия лекарственного препарата КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. КонтрСекс Нео[®] таблетки для котов и кобелей не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

1. ООО «НПК «СКИФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд дом 20, стр. 3, этаж 3, пом. I, ком. 35. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.