

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Актив Ист<sup>+</sup> для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель: фирма ООО «Ангел Ист Рус», Липецкая область, г. Данков)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Актив Ист<sup>+</sup> (Active Yeast<sup>+</sup>) – кормовая добавка для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

2. Актив Ист<sup>+</sup> представляет собой сухую культуру живых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* (штамм M207177). В 1 г Актив Ист<sup>+</sup> содержится не менее  $2,0 \times 10^{10}$  КОЕ (колониеобразующих единиц) *Saccharomyces cerevisiae* (содержание 99,0-99,5%) и эмульгатор сорбитан моностеарат (0,4-0,6%).

Актив Ист<sup>+</sup> не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. Актив Ист<sup>+</sup> по внешнему виду представляет собой гранулы светло-желтого цвета со слабым запахом дрожжей.

4. Актив Ист<sup>+</sup> выпускают расфасованным по 500 г и 10 кг в вакуумную упаковку из фольги.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой с указанием: наименования, адреса и товарного знака организации–производителя, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, её состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, стандарта организации, регистрационного номера, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Актив Ист<sup>+</sup> хранят в упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 5°С до 30°С.

Срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.

Актив Ист<sup>+</sup> запрещается использовать по истечении срока хранения.

### II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*, входящие в состав кормовой добавки Актив Ист<sup>+</sup>, стимулируют в кишечнике рост полезной микрофлоры, активизируют процессы пищеварения, повышают усвоение питательных веществ корма, благоприятно влияют на обмен веществ в организме.

Применение Актив Ист<sup>+</sup> оптимизирует процессы пищеварения и способствует повышению продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Актив Ист<sup>+</sup> предназначен для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

7. Актив Ист<sup>+</sup> применяют индивидуально или групповым методом в составе премиксов, комбикормов, кормовых смесей, минерально-витаминных добавок. Добавку кормовую вводят в комбикорма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Корма, содержащие кормовую добавку, не рекомендуется подвергать гранулированию и экспандированию при температуре выше 105°C.

Норма ввода групповым методом из расчёта на тонну корма:

Свиноматкам, хрякам	0,5-1 кг/т корма
Поросятам в подсосный период (с 10-го дня жизни до отъёма)	1,5 кг/т корма
Поросятам в период дорастивания	1,0 кг/т корма
Поросятам в период откорма	0,5 кг/т корма
Коровам в период лактации	1-2 кг/т корма
Телятам	0,6-0,8 кг/т корма
Сухостойным коровам	0,5-0,7 кг/т корма
Цыплятам-бройлерам	0,3-0,6 кг/т корма
Курам-несушкам	0,3-0,6 кг/т корма

Норма ввода индивидуальным методом в сутки:

Поросятам в подсосный период (с 10-го дня жизни до отъёма)	1 г на 20 кг живого веса
Телятам	2-6 г на голову
Коровам	10-20 г на голову

Актив Ист<sup>+</sup> рекомендуется применять на протяжении всего продуктивного периода животных и птицы.

8. Побочных явлений и осложнений при применении Актив Ист<sup>+</sup> в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

9. Актив Ист<sup>+</sup> совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

10. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Актив Ист<sup>+</sup> и в случае вынужденного убоя можно использовать в пищевых целях без ограничения.

### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с кормовой добавкой Актив Ист<sup>+</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

12. Актив Ист<sup>+</sup> следует хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации разработчика кормовой добавки: «AngelYeast Co., Ltd.» (ООО «Ангел Ист Ко.») 168 Chengdong Avenue, Yichang, Hubei 443003; (443003, г. Ичан, п. Хубей, пр-т Чэндун, 168), КНР

Наименование и адрес организации производителя кормовой добавки:

ООО «Ангел Ист Рус» 399850, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Льва Толстого, д.36, оф.1.

Адрес производственной площадки: 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Экономическая, д. 8.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-30.19/03500