

Показания к применению

Назначают сельскохозяйственным животным и птице для профилактики и лечения бактериальных заболеваний, в т. ч. пастереллеза, колибактериоза, сальмонеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, листериоза, некробактериоза, актиномикоза, рожистой септицемии, бронхопневмонии, дизентерии, паратифа, токсической диспепсии, а также острых и хронических желудочно-кишечных и легочных заболеваний бактериальной этиологии у телят, поросят и пушных зверей; кокцидиоза, пуллороза, колисептицемии, холеры, микоплазмоза, ларинготрахеита и орнитоза птиц. Для стимулирования и ускорения роста молодняка, повышения продуктивности.

Дозировка и применение

Биовит дают в смеси с кормом, водой или молоком, обратом, ЗЦМ.

В профилактических целях - 1 раз в сутки в течение 5 – 20 дней. С лечебной целью - 2 раза в сутки в течение 4 – 5 дней и еще 3 дня после исчезновения симптомов болезни из расчета на 1 животное (грамм):

Вид животных	Количество , г
Телята 5 – 10 дней	5
Телята 11 – 30 дней	6
Телята 31 – 60 дней	8
Телята 61 – 120 дней	10
Поросята 5 – 10 дней	0,75
Поросята 11 – 30 дней	1,5
Поросята 31 – 60 дней	3
Поросята 61 – 120 дней	7.50
Кролики и пушные звери	0.13 – 0.20
Птица (молодняк)	0,63 г на 1 кг массы тела

Противопоказания

Беременным животным не рекомендуется длительное применение.

Особые указания

Забой животных и птицы на мясо - через 6 суток после последнего дня применения Биовита.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте. Отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от -20 до +37 °С