

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ковертала животным при заболеваниях печени различной этиологии

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ковертал.

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Ковертал содержит компоненты растительного происхождения (в 1000 мл): Chelidonium majus Ø – 0,3 пл, Citrullus colocynthis Ø=D1 – 0,15 нл, Lycopodium clavatum Ø=D1 – 0,15 фл, Silybum marianum Ø – 0,8 нл, Tagaxisum officinalis Ø – 20 мкл, Veronica officinalis Ø – 15 мкл и вспомогательные вещества: метил парагидроксibenзоат – 0,5 г, натрия хлорид – 5,8 г, натрия ацетата тригидрат – 2,0 г, кислоту соляную до pH 5,4, спирт этиловый 95% – 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

3. Выпускают Ковертал расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и алюминиевыми закатываемыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

4. Ковертал хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 21 день. Ковертал запрещается применять по истечении срока годности.

5. Ковертал следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Ковертал относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Входящие в состав лекарственного средства активные компоненты в гомеопатических разведениях способствуют активации и защите фосфолипидозависимых ферментных систем гепатоцитов, улучшают детоксикационную функцию печени, обладают

гепатопротекторным и противовоспалительным действием, оказывают выраженное спазмолитическое, антихолестатическое действие.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

8. Ковертал назначают с лечебной целью собакам, кошкам, крупному рогатому скоту, лошадям при острых и хронических гепатитах, гепатозах, жировой дегенерации печени, токсических поражениях печени, инфекционных и инвазионных заболеваниях в качестве сопутствующей терапии.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

10. Ковертал применяют внутримышечно или подкожно в разовых дозах:

- собакам, кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- крупному рогатому скоту, лошадям – 5,0 мл/животное;
- телятам, жеребятам – 2,0-3,0 мл/животное.

В острых случаях заболевания Ковертал применяют 1 раз в сутки в течение 10-14 дней, при хронических заболеваниях 2-3 раза в неделю в течение 3-5 недель.

11. Симптомы передозировки у животных не установлены.

12. Особеностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

14. При применении Ковертала в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Применение Ковертала не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

16. Продукция животного происхождения во время и после применения Ковертала может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Коверталом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Ковертала следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Адрес места производства: 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Инструкция разработана ООО «АлексАнн» (141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения:

С утверждением настоящей инструкции ~~с утрачивает силу~~ инструкция по применению Ковертала раствора для инъекций, утвержденная Россельхознадзором 03 февраля 2010 года.