

Инструкция рассмотрена и одобрена  
на Ветбиофармсовете  
«10» июля 2015 г.  
Протокол № 80.

## ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата ветеринарного «КВАНТУМ»

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Квантум (Kvantum).

1.2 Квантум - противопаразитарный препарат, представляющий собой таблетки плоскоцилиндрической формы с риской, белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета.

В каждой таблетке содержится 100 мг мебендазола, 50 мг празиквантела, вспомогательные и формаобразующие компоненты.

1.3 Препарат выпускают в полимерной упаковке по 2, 4, 6, 8, 10 или 20 таблеток; блистерах из металлизированной фольги или стрип-пакетах из алюминиевой фольги или ламинированной бумаги по 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 или 20 таблеток, помещенных в картонную коробку по 1, 2, 3, 4 или 5 штук.

1.4 Квантум хранят с предосторожностью (список Б) при температуре от 0°C до плюс 25°C, в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности - 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

### 2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Мебендазол, входящий в состав Квантума - антигельминтик широкого спектра действия, по химическому строению относится к производным бензимида зол карбамата. Мебендазол действует на все фазы развития гельминтов, в т.ч. на *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonine*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia spp.*

Механизм действия мебендазола заключается в нарушении синтеза клеточного тубулина, угнетении утилизации глюкозы и торможении образования АТФ у гельминтов, что приводит к их гибели.

Мебендазол медленно и частично всасывается в желудочно-кишечном тракте. В крови на 90% связывается с белками. В печени биотрансформируется до 2-амино-производного. Более 90% дозы выводится в неизмененном виде с фекалиями.

2.2 Празиквантел, входящий в состав Квантума, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых форм ленточных гельминтов, в т.ч. *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Multiceps multiceps*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*.

Празиквантел повышает проницаемость мембран клеток гельминтов для ионов кальция, вызывая генерализованное сокращение мускулатуры паразита, переходящее в стойкий паралич, ведущий к гибели гельминта.

Празиквантел хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте при оральном введении. Связывается с белками плазмы на 80%. Подвергается биотрансформации в печени с образованием неактивных моно- и полигидроксилированных метаболитов. Выводится преимущественно почками и в небольшом количестве - с фекалиями.

2.3 Препарат по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

### **3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

3.1 Квантум назначают собакам и кошкам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз), цестодозах (дипилидиоз, тениидоз, эхинококкозы) и смешанных гельминтозах.

3.2 С лечебной целью собак и кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного (10 мг/кг по мебендазолу и 5 мг/кг по празиквантелу), а также за 7-14 дней до вакцинации.

3.3 Квантум применяют животным индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма. Предварительной голодной диеты и применение слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Препарат применяют в следующих дозах:

- для кошек и маленьких собак массой: 0,5-2 кг	1/4 таблетки
2-5 кг	1/2 таблетки
5-10 кг	1 таблетка
- для средних собак массой: 10-20 кг	2 таблетки
20-30 кг	3 таблетки
- для больших собак массой: 30-40 кг и более	4 таблетки

При высокой степени инвазии животных обработку повторяют через 14 дней.

3.4 Противопоказанием к применению Квантума является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение Квантума истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, щенкам моложе 4-недельного возраста, котятам моложе 6-недельного возраста, беременным и лактирующим самкам.

3.5 При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта.

3.6 Следует избегать нарушения рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению эффективности препарата.

3.7 Побочных явлений и осложнений при применении Квантума в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного средства и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

3.8 Квантум не следует применять одновременно с другими антигельминтными препаратами.

### **4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Упаковку из-под препарата запрещено использовать для бытовых целей.

### **5 ПОРЯДОК ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19<sup>а</sup>) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

## 6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Иностранные производственные унитарные предприятия «ВИК – здоровье животных»

210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 29

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (И.А. Ятусевич, В.В. Петров), паразитологии (В.В. Петрукович, И.П. Захарченко) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и иностранного унитарного предприятия «ВИК – здоровье животных».

