

ИНСТРУКЦИЯ

по применению капель глазных Лакрикан для лечения
и профилактики конъюнктивитов и блефаритов у собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: капли глазные Лакрикан (Guttae ophthalmicae Lakrikan).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, ментол, бензокаин.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Капли глазные Лакрикан в качестве действующих веществ содержат полигексаметиленгуанидина гидрохлорида – 0,02%, ментол – 0,005%, анестезин – 0,002%, а в качестве вспомогательных веществ поливиниловый спирт – 1,0%, полиэтиленоксид 400 – 1,5% и воду дистиллированную до 100%. По внешнему виду препарат представляет собой однородную, бесцветную, прозрачную, пенящуюся при встряхивании жидкость.

3. Капли глазные Лакрикан выпускают расфасованными в полимерные или стеклянные флаконы, укупоренные крышками-капельницами или резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в картонную коробку и снабжают инструкцией по применению.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия упаковки капли глазные Лакрикан хранить не более месяца при закрытой крышке или пробке.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Хранят капли глазные Лакрикан в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0⁰С до 20⁰С.

5. Капли глазные Лакрикан следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Капли глазные Лакрикан – антибактериальный, противовоспалительный препарат.

Полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая золотистый стафилококк, синегнойную палочку. Механизм действия полигексаметиленгуанидина гидрохлорида заключается в связывании катионов со стенками бактериальных клеток, нарушении осмотического равновесия, что приводит к снижению уровня клеточной АТФ, препятствует репликации нуклеиновых кислот и угнетает дыхательную систему. В совокупности этот комплекс воздействий препарата приводит к гибели микроорганизма.

Ментол оказывает местное обезболивающее и противовоспалительное действие, уменьшает отечность за счет сужения слизистой оболочки глаз. Анестезин – оказывает местноанестезирующее действие.

Капли глазные Лакрикан по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

8. Капли глазные Лакрикан применяют собакам и кошкам в целях профилактики и лечения конъюнктивитов и блефаритов бактериальной этиологии и гигиенической обработки глаз.

9. Противопоказания к применению препарата не установлены.

10. При наличии обильного выделения предварительно проводят гигиеническую обработку глаза – смоченной препаратом стерильной марлевой салфеткой обрабатывают уголки глаз и веки, удаляют экссудат и засохшие корочки. После этого в каждый глаз закапывают по 1 – 2 капли Лакрикана. Обработку проводят 2 – 3 раза в день в течение 8 – 10 дней.

При необходимости курс лечения повторяют.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении капель глазных Лакрикан в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о взаимодействии капель глазных Лакрикан с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

16. Капли глазные Лакрикан не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с каплями глазными Лакрикан следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с

лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями глазами Лакрикан. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 20, литер "А".

Инструкция разработана: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению капель глазных Лакрикан, утвержденную Россельхознадзором 21 декабря 2007 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения.