

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

25 АПР 2022

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Лацилин-нео

(Организация-разработчик: ООО «РЕПРОВЕТ»,  
140563, Московская обл., г. Озеры, ул. Ленина, д. 252)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-8.22-4877 N17BP-3-8.22/03720

1. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
- торговое наименование: Лацилин-нео (Lacilin-neo).  
- международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций гомеопатический.

Лацилин-нео в 1,0 мл содержит в качестве действующих веществ настойки матричные гомеопатические: *Echinacea purpurea* (Эхинацея пурпуреа) Ø – 6,0 мг, *Pulsatilla pratensis* (Пульсатилла пратенсис) Ø – 0,6 мг, а также вспомогательные вещества: натрия хлорид, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.

Не применять по истечении срока годности.

4. Лацилин-нео выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла, укупоренные резиновыми пробками, укрепленные алюминиевыми колпачками. Каждая единица фасовки снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Лацилин-нео следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гомеопатические средства.

10. Компоненты, входящие в состав Лацилин-нео, обладают противовоспалительным, утеротоническим и иммуностимулирующим действиями. Эхинацея пурпуреа обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Пульсатилла пратенсис способствует сокращению матки за счёт улучшения выработки эндогенного окситоцина.

По степени воздействия на организм Лацилин-нео относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Лацилин-нео назначают для лечения острого и хронического катарального эндометрита у коров.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Лацилин-нео. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Лекарственный препарат не предназначен для применения в период беременности.

15. При лечении острого или хронического катарального эндометрита у коров Лацилин-нео применяют один раз в сутки с интервалом 24 ч внутримышечно в дозе 7 мл/животное в течение 5 суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Лацилин-нео в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций, использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки при применении Лацилин-нео не выявлены.

18. Сведения о несовместимости Лацилин-нео с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозировках и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства в период лечения и после последнего применения препарата Лацилин-нео разрешается использовать без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,  
Московская обл., г. Озеры, ул.  
Ленина, д. 252.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,  
Московская обл., г. Озеры, ул.  
Ленина, д. 252.