

01 ИЮЛ 2022

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Мамифорт Секадо

(Организация-разработчик: «Laboratorios SYVA s.a.u.», Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57, 24010 Leon, Spain / «Лабораториос СИВА с.а.ю.», Пр. Парроко Пабло Диэс, 49-57, 24010, Леон, Испания)

Номер регистрационного удостоверения: 724-3-13.13-1424№ПВИ-3-11.7/02349

1. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
- торговое наименование: Мамифорт Секадо (Mamifort Secado).  
- международное непатентованное наименование: ампициллин, клоксациллин.
2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.  
Мамифорт Секадо в 1 шприце-дозаторе (8 г) содержит в качестве действующих веществ: ампициллина (тригидрат) - 250 мг, клоксациллина (бензатин) – 500 мг, а также вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, алюминия моностеарат, жидкий парафин.
3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию белого цвета.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.  
Не применять препарат по истечении срока годности.
4. Мамифорт Секадо выпускают расфасованным в шприцы-дозаторы по 8 г, упакованные по 48 штук в полиэтиленовые ведра вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 4 °С до 25 °С.
6. Мамифорт Секадо следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: пенициллины в комбинациях.
10. Комбинация ампициллина и клоксациллина, входящих в состав Мамифорта Секадо, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, наиболее часто выделяемых при мастите коров, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus disagalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Escherichia coli*.

Механизм бактерицидного действия ампициллина и клоксациллина основан на ингибировании транспептидазы и карбоксипептидазы микроорганизмов, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерий, приводит к нарушению осмотического баланса и гибели бактерий.

После введения Мамифорта Секадо, бактерицидные концентрации действующих веществ в пораженной четверти вымени сохраняются на протяжении 4-х недель.

Мамифорт Секадо по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего действия на ткани молочной железы.

### III. Порядок применения

11. Мамифорт Секадо назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью при маститах у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к антибиотикам группы пенициллинов и/или к одному из компонентов препарата (в том числе в анамнезе).

13. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мамифортом Секадо. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Мамифорт Секадо запрещается применять коровам в период лактации и менее чем за 42 дня до отела, ввиду длительного выделения клоксациллина с молоком.

15. Мамифорт Секадо вводят после последней дойки перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 42 дня до предполагаемого отела, однократно интрацистернально, по 8 г (содержимое шприца-дозатора) в каждую четверть вымени.

Перед введением лекарственного препарата молоко из больных четвертей вымени выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают антисептическим средством. Канюлю шприца-дозатора помещают в канал соска и осторожно выдавливают содержимое в пораженную четверть вымени. Вынимают шприц-дозатор и пальцами пережимают сосок на 1-2 минуты. Проводят легкий массаж соска снизу вверх для лучшего распределения препарата.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мамифорта Секадо в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки не выявлены.

18. Мамифорт Секадо не следует назначать одновременно с другими антибактериальными препаратами для интрацистернального введения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Мамифорт Секадо предназначен для однократного применения.


21. В пищевых целях молоко разрешается использовать не ранее, чем через 120 часов после отела. Молоко, полученное после отела коров до истечения установленного срока, разрешается использовать после кипячения в корм животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего введения. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной «Laboratorios SYVA s.a.u.», Avda. Parroco Pablo площадки производителя лекарственного Diez, 49-57, 24010 Leon, Spain / «Лаботориос препарата для ветеринарного применения: СИВА с.а.ю.», Пр. Парроко Пабло Диез, 49-57, 24010, Леон, Испания

Наименование, адрес организации, ООО «РегНива»,  
уполномоченной владельцем 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.17, офис 7096,  
регистрационного удостоверения тел.: +7 (495) 407-09-13  
лекарственного препарата на принятие pharmacovigilance@regniva.com.  
претензий от потребителя

Представитель «Laboratorios SYVA s.a.u.» в Российской Федерации  
Генеральный директор ООО «РегНива»



Исаков А. А.