

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Масла камфорного 10 %
для лечения артритов, бурситов, миозитов, тендинитов у животных,
а также субклинического мастита у коров в сухостойный период

(Организация-разработчик ООО НПП «Агрофарм»; Россия,
 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к.18)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Масло камфорное 10 % (*Oleum Camphoratum 10 %*).

Международное непатентованное наименование: камфора.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Лекарственный препарат в 100 г в качестве действующего вещества содержит камфору - 10 г и вспомогательное вещество масло подсолнечное.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость желтого цвета со специфическим запахом камфоры.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 2 года с даты производства.

Запрещается применение Масла камфорного 10 % по истечении срока годности.

4. Масло камфорное 10 % выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из нейтрального стекла, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками; по 100 мл во флаконы и по 1000 мл в бутылки полимерные, закрытые навинчивающимися пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Масло камфорное 10 % хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 20 °C.

6. Масло камфорное 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается Масло камфорное 10 % без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Масло камфорное 10 % относится к противовоспалительным препаратам для наружного применения.

10. Масло камфорное 10 % при местном применении оказывает анальгизирующее, раздражающее, противовоспалительное, антисептическое действие.

Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам «малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Масло камфорное 10 % применяют при лечении артритов, бурситов, миозитов, тендинитов у животных, а также субклинического мастита у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к камфоре.

13. Масло камфорное 10 % применяют наружно в виде растираний, нанося его тонким ровным слоем на участок кожи в области воспалительного процесса, и массирующими движениями втирают в течение 2-3 минут 1-2 раза в сутки в течение 10-12 дней. Не следует наносить препарат на участки с нарушением целостности кожного покрова.

14. Симптомов передозировки у животных не выявлено.

15. Особеностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

17. При применении Масла камфорного 10 % в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

18. Масло камфорное 10 % не применяют одновременно с другими лекарственными средствами для наружного использования.

19. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 1 сутки после последнего применения Масла камфорного 10 %. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

IV. Меры личной профилактики

20. При проведении лечебных мероприятий с использованием Масла камфорного 10 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

21. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Маслом камфорным 10 %. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки, их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Масла камфорного 10 %, утвержденная Россельхознадзором 09 ноября 2012 г.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО НПП «Агрофарм», Россия,
394087, Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114-б

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО НПП «Агрофарм», Россия,
394087, Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114-б

Номер регистрационного удостоверения 15-3-25.13-3304 СТВР-3-19/000278