

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.06.2020

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мастинол-форте

(Организация-разработчик: ООО «РЕПРОВЕТ»,
140563, Московская обл., г Озеры, ул. Ленина, д. 252)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-10.20-4680N/76P-3-10.20/03564

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование: Мастинол-форте (Mastinol-forte).
- международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Мастинол-форте в 1,0 г содержит в качестве действующих веществ настойки гомеопатические матричные: Фитолякка американа $\emptyset = 1,0$ мг, Атропа белла-донна $\emptyset = 0,5$ мг, Бриония $\emptyset = 0,5$ мг, а также вспомогательные вещества: натрия хлорид, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.

Не применять по истечении срока годности.

4. Мастинол-форте выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая единица потребительской упаковки снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Мастинол-форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: комбинированный гомеопатический лекарственный препарат.

10. Компоненты, входящие в состав Мاستиноп-форте, обладают противовоспалительным, противоотечным, и обезболивающим действиями, способствуют восстановлению секреторной функции молочной железы. Активные компоненты, входящие в состав препарата, обладают взаимным синергетическим действием.

Фитолякка американа оказывает противовоспалительное действие на железистую ткань, активизирует молочно-секреторную функцию молочной железы.

Атропа беллла-донна и Бриония обладают противовоспалительным действием за счёт гипотензивного воздействия на артериолы и периферические нервные окончания, устраняют артериальную гиперемия и отёк при локализованном воспалении.

По степени воздействия на организм Мاستиноп-форте относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Мاستиноп-форте назначают для лечения субклинического и острого серозно-катарального маститов у коров.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мاستиноп-форте. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Особенности применения самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. При лечении субклинического мастита Мاستиноп-форте применяют один раз в сутки с интервалом 24 ч внутримышечно в дозе 7 мл/животное в течение 3 суток.

При лечении острого серозно-катарального мастита препарат применяют с интервалом 12 ч подкожно в области воспаленной четверти молочной железы в дозе 7 мл/животное с одновременным интраквартальным введением 7 мл препарата в воспаленную четверть молочной железы через стерильный катетер. Курс лечения составляет 5 суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мастинол-форте в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций, использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки при применении Мастинол-форте не выявлены.

18. Сведения о несовместимости Мастинол-форте с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозировках и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства в период лечения и после последнего применения препарата Мастинол-форте разрешается использовать на общих основаниях.

Наименование производственной производителя препарата для применения	и площадки лекарственного ветеринарного	адрес ООО «РЕПРОВЕТ», 140563, Московская обл., г Озеры, ул. Ленина, д. 252.
--	--	--

Наименование, уполномоченной регистрационного лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	адрес организации, владелец удостоверения	ООО «РЕПРОВЕТ», 140563, Московская обл., г Озеры, ул. Ленина, д. 252.
--	--	---