

28.03.2025

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

Мастинол-форте

(Организация-разработчик: ООО «РЕПРОВЕТ»,

140563, Московская обл., г.о.Коломна, г. Озеры, ул. Ленина, д. 252)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-10.20-4680№ПВР-3-10.20/03564

## I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование: Мастинол-форте (Mastinol-forte).

- международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Мастинол-форте в 1,0 мл содержит в качестве действующих веществ настойки гомеопатические матричные: *Phytolacca Americana* Ø – 1 мг, *Atropa bella-donna* Ø – 0,5 мг, *Bryonia* Ø – 0,5 мг; а также вспомогательные вещества: нипагин, натрия хлорид, вода для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона - 28 дней.

Не применять по истечении срока годности.

4. Мастинол-форте выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая единица потребительской упаковки снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Мастинол-форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: комбинированный гомеопатический лекарственный препарат.

10. Компоненты, входящие в состав Мастинол-форте, обладают противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим действиями, способствуют восстановлению секреторной функции молочной железы. Активные компоненты, входящие в состав препарата, обладают взаимным синергетическим действием.

Фитолякка американа оказывает противовоспалительное действие на железистую ткань, активизирует молочно-секреторную функцию молочной железы.

Атропа беллла-донна и Бриония обладают противовоспалительным действием за счёт гипотензивного воздействия на артериолы и периферические нервные окончания, устраняют артериальную гиперемия и отёк при локализованном воспалении.

По степени воздействия на организм Мастинол-форте относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

11. Мастинол-форте назначают для лечения субклинического и острого серозно-катарального маститов у коров.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мастинол-форте. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Особенности применения самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. При лечении субклинического мастита Мастинол-форте применяют один раз в сутки с интервалом 24 ч внутримышечно в дозе 7 мл/животное в течение 3-х суток.

При лечении острого серозно-катарального мастита препарат применяют с интервалом 12 ч подкожно в области воспаленной четверти молочной железы в дозе 7 мл/животное с одновременным интерцистернальным введением 7 мл препарата в воспаленную четверть молочной железы через стерильный катетер. Курс лечения составляет 5 суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мастинол-форте в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций, использование препарата прекращают и, при необходимости, назначают десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки при применении Мастинол-форте не выявлены.

18. Сведения о несовместимости Мастинол-форте с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозировках и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства в период лечения и после последнего применения препарата Мастинол-форте разрешается использовать на общих основаниях.

2

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,  
Московская обл., г.о. Коломна,  
г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,  
Московская обл., г.о. Коломна,  
г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Генеральный директор ООО «РЕПРОВЕТ»



Титов А.В.

3