

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мази ихтиоловой 10 % для лечения ран, ожогов, экзем, дерматитов и Мази ихтиоловой 20 % для лечения фурункулеза, пиодермии, заболеваний копыт и копытцев у животных
(Организация – разработчик: АО «Медхим», г. Сызрань, Самарская область, ул. Заводская, 5)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % (Unguentum Ichtyoli 10 % и 20 %).

Международное непатентованное наименование: ихтаммол.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Мазь ихтиоловая 10 % содержит в 100 г в качестве действующего вещества ихтиол - 10 г, а в качестве вспомогательного вещества – вазелин 90 г.

Мазь ихтиоловая 20 % содержит в 100 г в качестве действующего вещества ихтиол – 20 г, а в качестве вспомогательного вещества – вазелин 80 г.

3. По внешнему виду Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % представляет собой мазь темно-бурого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.

4. Выпускают Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % расфасованной по 20, 30, 60, 100, 150, 200, 250, 800 г в полимерных банках с герметично закрывающимися крышками. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению.

5. Хранят Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % в упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируется в соответствии с требованиями законодательства.

8. Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний кожи.

10. Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При нанесении на раны суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани. По степени воздействия на организм Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % применяют животным (кроме кошек) при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты); Мазь ихтиоловую 20% - при фурункулезе, пиодермии, заболеваниях копыт и копытцев.

12. Противопоказанием для применения Мази ихтиоловой 10 % и 20 % является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % применяют наружно 1 – 2 раза в сутки в течение 5-10 дней, нанося её ровным тонким слоем на поражённую поверхность.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

16. Возможно применение Мази ихтиоловой 10 % и 20 % молодняку, беременным и лактирующим животным. Следует избегать попадания препарата на соски дойным и лактирующим животным;

17. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

18. Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % не вызывает у животных побочных действий, нежелательных реакций и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

19. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами для местного применения.

20. Продукцию животноводства во время и после применения Мази ихтиоловой 10 % и 20 % используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мазью ихтиоловой 10 % и 20 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10 % и 20 %. По окончании работы с препаратом, руки следует вымыть тёплой водой с мылом. Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством

воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	АО «Медхим», 446021, г. Сызрань, Самарская область, ул. Заводская, 5
--	--

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	АО «Медхим», 446021, г. Сызрань, Самарская область, ул. Заводская, 5
--	--

Номер регистрационного удостоверения 26-3-3.14-2753№ПВР-3-1.9/00119