

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

05.07.2019

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Мазь ихтиоловая 10 % и 20 %

(организация-разработчик: ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир)  
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина 4-Б)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-5.19-4451№ПВР-3-1.9/00119

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % (Unguentum Ichthyoli  
10 %, 20 %)

международное непатентованное наименование: ихтаммол (ихтиол).

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь ихтиоловая 10 % содержит в 100 г в качестве действующего вещества  
ихтиол - 10 г, а в качестве вспомогательного вещества - вазелин до 100 г.

Мазь ихтиоловая 20 % содержит в 100 г в качестве действующего вещества  
ихтиол - 20 г, а в качестве вспомогательного вещества - вазелин до 100 г.

3. По внешнему виду препарат представляет собой мазь темно-бурого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий  
хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

Запрещается применять Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % по истечении срока  
годности.

4. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % выпускают расфасованной по 40, 70, 200,  
500 и 800 г в банки полимерные соответствующей вместимости, укупоренные  
крышками с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка  
лекарственного препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % хранят в закрытой упаковке производителя  
в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов  
питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % следует хранить в недоступном для детей  
месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % относится к антисептическим лекарственным средствам.

10. Препарат оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При нанесении на раны суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

По степени воздействия на организм Мазь ихтиоловая 10 % и 20 % относится к веществам 4 класса опасности - вещества малоопасные в соответствии классификацией ГОСТ 12.1.007-76, в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

## III. Порядок применения

11. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % применяют животным (кроме кошек) при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты); Мазь ихтиоловую 20 % - при фурункулезе, пиодермии, заболеваниях копыт и копытцев.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с Мазью ихтиоловой 10 % и 20 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу, после работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10 % и 20 %. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Мазь ихтиоловую 10 % и 20% можно применять беременным животным, в период лактации и потомству животных, обработки следует проводить с осторожностью, не допускать попадания мази в глаза, нос, рот, а дойным и лактирующим животным на соски.

15. Мазь ихтиоловую 10 % и 20 % применяют наружно 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней, нанося ее ровным тонким слоем на пораженную поверхность. При необходимости предварительно проводят туалет раневой поверхности.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата возможно появление признаков раздражения кожи (покраснение, зуд, сыпь). В этом случае обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Применение Мази ихтиоловой 10 % и 20 % исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

19. Особенности действия при первом применении препарата или его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, поскольку это может привести к снижению его эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее, далее интервал между обработками не изменяется.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных во время и после применения Мази ихтиоловой 10 % и 20 % в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничения.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

ООО «Торговый дом «БиАгро»,  
Россия, 600014, Владимирская обл.,  
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий  
от потребителя

ООО «Торговый дом «БиАгро»,  
Россия, 600014, Владимирская обл.,  
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б