

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А.ВЛАСОВ

09.08.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению Мази ихтиоловой 10% и 20%

(Организация – разработчик: Акционерное общество «Медхим»
446021, Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань, Заводская ул., д.5)

Номер регистрационного удостоверения: 26-3-3.14-2753№ПВР-3-1.9/00119

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата:
Мазь ихтиоловая 10% и 20%.
Международное непатентованное наименование: ихтаммол.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Мазь ихтиоловая 10% содержит в 100 г в качестве действующего вещества ихтиол – 10 000 мг, а в качестве вспомогательного вещества – вазелин 90 000 мг.
Мазь ихтиоловая 20% содержит в 100 г в качестве действующего вещества ихтиол – 20 000 мг, а в качестве вспомогательного вещества – вазелин 80 000 мг.
3. По внешнему виду Мазь ихтиоловая 10% и 20% представляет собой мазь темно-бурого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.
4. Выпускают Мазь ихтиоловую 10% и 20% расфасованной по 200, 400, 800 г в полимерных банках с герметично закрывающимися крышками. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению.
5. Хранят Мазь ихтиоловую 10% и 20% в упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищённом от света месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.
6. Мазь ихтиоловую 10% и 20% следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируется в соответствии с требованиями законодательства.
8. Мазь ихтиоловая 10% и 20% отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Мазь ихтиоловая 10% и 20% относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний кожи.

10. Мазь ихтиоловая 10% и 20% оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При нанесении на пораженную поверхность суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

Действующие вещества препарата практически не абсорбируются в системный кровоток.

По степени воздействия на организм Мазь ихтиоловая 10% и 20% согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Мазь ихтиоловую 10% применяют животным (кроме кошек) при заболеваниях кожи (экземы, дерматиты); Мазь ихтиоловую 20% - при фурункулезе, пиодермии, заболеваниях копыт и копытцев.

12. Противопоказанием для применения Мази ихтиоловой 10% и 20% является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Меры предосторожности при применении:

- при работе с Мазью ихтиоловой 10% и 20% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами;

- людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10% и 20%;

- по окончании работы с препаратом, руки следует вымыть тёплой водой с мылом;

- пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами;

- при случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды;

- в случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Возможно применение Мази ихтиоловой 10% и 20% молодняку, беременным и лактирующим животным. Следует избегать попадания препарата на соски дойным и лактирующим животным.

15. Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют наружно 1 – 2 раза в сутки в течение 5-10 дней, нанося её ровным тонким слоем на поражённую поверхность.

16. Мазь ихтиоловая 10% и 20% не вызывает у животных побочных действий, нежелательных реакций и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
18. Мазь ихтиоловую 10% и 20% не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами для местного применения.
19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.
20. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.
21. Продукцию животноводства во время и после применения Мази ихтиоловой 10% и 20% используют без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

Акционерное общество «Медхим»
446021, Российская Федерация,
Самарская обл., г. Сызрань,
Заводская ул., д. 5

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

Акционерное общество «Медхим»
446021, Российская Федерация,
Самарская обл., г. Сызрань,
Заводская ул., д. 5