



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

14 ЯНВ 2025

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Мелоксикам Апиценна

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: _____

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Мелоксикам Апиценна (Meloxicam Apicenna);
международное непатентованное наименование: мелоксикам.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Мелоксикам Апиценна в качестве действующего вещества содержит мелоксикам. Выпускают лекарственный препарат в двух дозировках с содержанием мелоксикама в каждой таблетке: 0,5 и 2,0 мг. В качестве вспомогательных веществ содержит целлюлозу микрокристаллическую, натрия крахмалгликолят (тип А), кремния диоксид коллоидный, аспасвит Ц 200, тальк, кальция стеарат, лактозы моногидрат.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой овальные таблетки от белого до светло-желтого цвета с одной риской на обеих сторонах.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применение препарата Мелоксикам Апиценна по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 10 таблеток в блистеры из фольги алюминиевой и пленки ПВХ или по 10 таблеток в полимерные банки, укупоренные пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждую банку оклеивают этикетками самоклеящимися.

Блистеры упаковывают по 1, 2, 3 в пачку из картона. Банки упаковывают поштучно в пачку из картона. Каждую потребительскую упаковку препарата комплектуют инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Мелоксикам Апиценна следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мелоксикам Апиценна относится к нестероидным противовоспалительным лекарственным препаратам.

10. Мелоксикам, входящий в состав препарата, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, механизм которого основан на способности ингибировать выработку циклооксигеназы в цикле арахидоновой кислоты, подавляя преимущественно циклооксигеназу-II, под влиянием которой происходит синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаления, отек и боль.

При пероральном применении лекарственного препарата мелоксикам легко всасывается в кишечнике и достигает максимальной концентрации в плазме крови в течение 7,5 часов, период полувыведения составляет 24 часа. Метаболизируется мелоксикам в печени, выводится из организма главным образом с желчью (до 75%) в основном в виде метаболита глюкуроновой кислоты.

Мелоксикам Апиценна по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно классификации ГОСТ 12.1.007), в рекомендованных дозах не обладает тератогенными, эмбриотоксическими и канцерогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. Препарат применяют в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и болеутоляющего средства при воспалительных и болевых синдромах различного происхождения у собак и кошек, включая острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, синовиты, вывихи), воспалительные заболевания мягких тканей, а также в послеоперационный период.

12. Противопоказанием к применению препарата является гиперчувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применение лекарственного препарата Мелоксикам Апиценна при язве желудка и 12-перстной кишки, выраженной почечной, печеночной и сердечной недостаточности, геморрагическом синдроме, животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии, ввиду возможного токсического влияния лекарственного препарата на почки.

13. При работе с препаратом Мелоксикам Апиценна следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует промыть

большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Мелоксикам Апиценна. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Мелоксикам Апиценна не предназначен для применения беременным и лактирующим самкам, щенкам и котятм моложе 6-недельного возраста.

15. Мелоксикам Апиценна применяют собакам и кошкам перорально, принудительно на корень языка 1 раз в сутки, во время кормления.

	Собаки		Кошки
	Мелоксикам Апиценна 0,5 мг	Мелоксикам Апиценна 2,0 мг	Мелоксикам Апиценна 0,5 мг
1-й день лечения	2 таблетки на каждые 5 кг массы животного	2 таблетки на каждые 20 кг массы животного	1 таблетка на каждые 5 кг массы животного
	0.2 мг мелоксикама на 1 кг массы животного		
2-й и последующие дни лечения*	1 таблетка на каждые 5 кг массы животного	1 таблетка на каждые 20 кг массы животного	0.1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного
	0.1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного		

*У кошек продолжительность курса должна быть не более 4 дней.

Продолжительность лечения определяется конкретным диагнозом и интенсивностью проявления клинических симптомов. В острых случаях лечение препаратом проводят в течение 5-7 дней. При хроническом течении заболевания у собак возможно применение препарата в течение 28 дней под контролем ветеринарного врача.

16. При применении препарата Мелоксикам Апиценна в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При применении препарата Мелоксикам Апиценна, как и при применении других нестероидных противовоспалительных препаратов, в редких случаях в первые дни лечения у животного возможны: потеря аппетита, рвота, диарея. Указанные симптомы, как правило, исчезают после отмены препарата. При индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные и симптоматические препараты.

17. При передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, нарушение функций желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, анорексия, желудочно-кишечное кровотечение).

Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма, и симптоматическая терапия.

18. Мелоксикам Апиценна не следует применять одновременно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикостероидами, диуретиками, антикоагулянтами, аминогликозидными антибиотиками и другими лекарственными препаратами, для которых характерна высокая степень связывания с сывороточными белками, из-за вероятности взаимного усиления нефротоксического действия, а также ранее, чем через 24 часа после окончания применения предыдущего нестероидного противовоспалительного препарата.

19. Особенности действия при первом приеме препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Мелоксикам Апиценна не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «Апиценна», 143985,
Московская область, г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Апиценна», 143985,
Московская область, г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.
+ 7 (495) 580-77-13,
www.apicenna.ru, info@apicenna.ru.

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН»



А.А. Смирнов