СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К.А. САВЕНКОВ
25 МАЙ 2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Метоменол®

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141705, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-09.26-5516/ПВР-3-09.26/04187

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Метоменол® (Metomenol®).

Химическое наименование: тиохроменол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Метоменол® в 1,0 мл в качестве действующего вещества содержит тиохроменол – 5 мг, в качестве вспомогательных веществ бензиловый спирт, пропиленгликоля дикаприлокапрат.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Метоменол® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Метоменол® расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Метоменол® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 до 30 °С.

6. Метоменол® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Метоменол® относится к неопиоидным ненаркотическим анальгезирующим средствам центрального действия.

10. Тиохроменол, действующее вещество препарата, обладает анальгетическим действием, механизм которого заключается в воздействии тиохроменола на каннабиноидные CB1-рецепторы, дофаминовые D1- и D2-рецепторы (агонист) и направлено на снижение активности ноцицептивной и повышение активности антиноцицептивной систем организма. Опиоидные рецепторы не вовлечены в реализацию анальгетического эффекта, в связи с чем побочные эффекты, свойственные наркотическим анальгетикам, не проявляются.

При подкожном введении тиохроменол быстро проникает из места инъекции в системный кровоток, обнаруживается в плазме крови животных спустя 15 – 30 минут после введения препарата. Максимальная концентрация тиохроменола в плазме крови собак достигается через 2-3 часа, среднее значение Cmax 16,7 нг/мл. Период полувыведения (T1/2) из плазмы крови составляет 17,6 ч. Средняя площадь под фармакокинетической кривой (AUC0-t) – 296,8 нг/мл*ч, AUC0-∞ - 350,1 нг/мл*ч, среднее время удержания препарата в организме – 24,4 часа.

Тиохроменол не метаболизируется. Выводится через печень и почки в неизменном виде. У пациентов с нарушенной функцией почек период полувыведения препарата может быть увеличен.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Метоменол® применяют собакам в качестве симптоматического анальгетического средства при умеренном и выраженном болевом синдроме различной этиологии (травмы, ортопедические патологии, стоматологические патологии, пиодермия, воспалительные заболевания ЖКТ, спастические сокращения кишечника, патологии мочевыводящей системы, боли в послеоперационный период, боли у онкологических пациентов), а также при премедикации.

12. Противопоказаниями к применению Метоменола® является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Животным с патологиями почек и печени следует применять препарат Метоменол® с осторожностью.

13. При работе с Метоменолом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару

из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Метоменола® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Метоменол® не обладает эмбриотоксическим, фетотоксическим и тератогенным действием. Беременным и кормящим самкам, а также щенкам моложе 6-месячного возраста следует применять препарат Метоменол® под контролем ветеринарного врача.

15. Метоменол® вводится в дозах 0,1-0,2 мл на 1 кг массы тела (0,5-1 мг тиохроменола на 1 кг массы тела) подкожно 1-2 раза в сутки.

Доза устанавливается индивидуально в зависимости от интенсивности болевого синдрома и реакции животного.

Продолжительность лечения 1-9 дней.

Возможно применение препарата в составе мультимодальной аналгезии в послеоперационный период и для премедикации.

При применении Метоменола® в премедикацию рекомендуется контролировать показатели гемодинамики, температуру тела. Прямого действия на дыхательный центр тиохроменол не оказывает.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и другое симптоматическое лечение. Возможно образование уплотнения в месте введения препарата, которое проходит самостоятельно, а также незначительное кратковременное обратимое понижение температуры тела.

17. В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных реакций. В редких случаях возможны реакции: со стороны ЦНС – кратковременное обратимое снижение двигательной активности, заторможенность. При передозировке возможно понижение температуры тела на 0,4-1°С, брадикардия, гипотония, умеренное обратимое повышение отдельных биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ), а также формирование безболезненного уплотнения в месте введения.

18. Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Не рекомендуется одновременное применение препарата с другими ненаркотическими анальгетиками центрального действия.

При применении препарата в схеме мультимодальной аналгезии в комбинациях с метамизолом натрия, мелоксикамом, ИПС лидокаина увеличения частоты возникновения нежелательных явлений и побочных

эффектов при использовании в течение 24-часового периода наблюдений не отмечалось.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом приеме и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО «АлексАнн», 141705, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «АлексАнн», 141705, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13

Генеральный директор ООО «АлексАнн» В.Н. Давыденков