

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Миомаг»

1. Торговое наименование.
Миомаг
2. Международное непатентованное наименование.
Карбахолин
3. Регистрационный номер.
9003-10-24 ЗПХ-Ф
4. Лекарственная форма.
Раствор для подкожного или внутримышечного введения.
Описание. Прозрачная бесцветная жидкость.
5. Состав.
1 мл препарата содержит 1,0 мг карбахолина и вспомогательные вещества: натрия хлорид, магний хлористый 6-водный, вода для инъекций.
6. Фармакотерапевтическая группа.
М-, Н- Холиномиметики, в том числе антихолинэстеразные средства.
7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Действующим веществом Миомага является карбахолин, который относится к веществам, действующим на периферические холинэргические структуры, стимулируя окончания м- и н-холинорецепторов (холиномиметик), усиливает сокращение гладких мышц матки, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и других органов.
Препарат не проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, меньше разрушается холинэстеразой и обладает более продолжительным действием, чем ацетилхолин.
Препарат по степени воздействия на организм относится к 1 классу опасности по ГОСТ 12.1007-76 (вещества чрезвычайно опасные), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического сенсibilизирующего действия.
8. Показания для применения.
Препарат применяют коровам для профилактики и лечения субинволюции матки, послеродовом метрите и эндометрите, при слабости родовых схваток и потуг, задержании последа.
9. Противопоказания.
Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.
Не применять животным, у которых при тимпании переполнен желудочно-кишечный тракт, при судорогах, заболеваниях сердца и органов дыхания, острых инфекционных заболеваниях. С осторожностью - истощенным животным.

10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят коровам подкожно или внутримышечно в следующих дозах:

- при слабых схватках и потугах – по 1,0 мл на инъекцию, однократно;
- при задержании последа (через 6-8 часов после выхода плода) 1-3 мл на инъекцию. При необходимости повторять с интервалом 48 часов, но не более двух инъекций;
- при послеродовом метрите и эндометрите (при условии, что шейка матки открыта, отсутствует вязкий гнойный экссудат, отсутствует персистентное желтое тело), для эвакуации воспалительного экссудата из полости матки – 1-3 мл на инъекцию трехкратно через 48 часов;
- для ускорения сроков инволюции матки в раннем послеродовом периоде (1-3 сутки после отела) – 1-3 мл на инъекцию трехкратно с интервалом 24-48 часов.

Не допускается применение препарата Миомаг чаще 1 раза в 24 часа, а также превышение рекомендуемой дозы. Максимальную дозу препарата можно рассчитать исходя из ограничения: не более 1 мл препарата на 250 кг массы тела животного.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При передозировке и у ослабленных животных могут наблюдаться одышка, диарея, слюнотечение, беспокойство, сужение зрачков, которые проходят самостоятельно через 7-12 часов. При этих явлениях вводят атропина сульфат в дозе 5,0 мг на 100 кг массы тела животного, кофеин.

13. Беременность и период лактации.

Препарат противопоказан в период беременности.

Разрешается применение в период лактации.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

15. Побочное действие.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

Препарат может вызвать болезненное раздражение в месте введения.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещено использование препарата одновременно с гормонами: окситоцин, пропранолол, простагландины, эстрогены из-за высокого риска многократного усиления утеротонического эффекта и возникновения побочных эффектов (слюнотечение, бронхоспазм).

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают по 100 мл во флаконах из темного стекла, герметично закупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий хранения. После первого вскрытия первичной упаковки - 28 суток при соблюдении правил асептики и хранения при температуре от 4 °С до 6 °С.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат требует специальные условия хранения. Миомаг хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается согласно законодательству страны обращения ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия утилизации.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Продукцию животноводства после применения препарата используют без ограничений.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата


Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БиАгро»
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БиАгро»
Адрес места производства: Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

ООО «Торговый дом «БиАгро»
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б.
Тел. (4922) 34-00-79, 34-16-21; e-mail:sale@bionit.ru





МАКЕТ ЭТИКЕТКИ

первичной (потребительской) упаковки

ветеринарного лекарственного препарата «Миомаг»

Размер 100 x 45



Масштаб 1:1



образец упаковки 100 мл

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 68 от 09.09.2016