



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Неотревел®

(Организация-разработчик: АО «НПФ» Экопром», 140070, Московская область,
г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: *32-3-03.26-5439N/17BP-3-03.26/04164*

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – Неотревел® (Neotritel®);
международное непатентованное наименование – дименгидринат.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Лекарственный препарат Неотревел® в качестве действующего вещества содержит дименгидринат. Выпускают препарат в модификациях: таблетка 125 мг с содержанием дименгидрината – 10 мг и таблетка 625 мг с содержанием дименгидрината – 50 мг.

В качестве вспомогательных веществ в препарате содержится: лактоза, кроскармеллоза натрия, стеарат кальция, желатин, аэросил А, аромат говядины.

3. Препарат представляет собой двояковыпуклые таблетки овальной формы с риской по центру, массой 125 мг и 625 мг, от белого до бежевого цвета; возможны вкрапления от светло-бежевого до коричневого цвета, обусловленные особенностями используемого сырья.

Срок годности Неотревел® при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. Не применять по истечении срока годности.

4. Неотревел® выпускают расфасованным по 5 и 10 таблеток в блистере, которые упаковывают в картонные пачки по 1-2 блистера вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Неотревел[®] относится к фармакотерапевтической группе холинолитики.
 10. Дименгидринат – хлортеофиллиновая соль дифенгидрамина, состоящая из 55% дифенгидрамина и 45% 8-хлортеофиллина. Относится к холинолитикам, которые воздействуют на органы пищеварения, тормозя секрецию и перистальтику, снимая спазм и снижая саливацию и др. Заявленное обусловлено снижением парасимпатического тонуса иннервируемых органов желудочно-кишечного тракта, экзокринных желез и др. Также предположительно антихолинергическое действие дименгидрината вызывает подавление вестибулярной стимуляции (в малых дозах действует на отолиты, а в больших – на полукружные каналы), которая возникает при укачивании или головокружении. Дименгидринат угнетает стимуляцию лабиринта.
- Неотревел[®] по степени воздействия на организм относится к веществам «умеренно опасным» (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007); в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия.

III. Порядок применения

11. Неотревел[®] применяют взрослым собакам и кошкам для профилактики кинетозов (симптоматики укачивания).
12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата или к антигистаминным препаратам этого класса, судорожный синдром, глаукома, острые экссудативные и везикулярные дерматозы, гипертиреоз, заболевания сердечно-сосудистой системы, стенозирующая пептическая язва, обструкция шейки мочевого пузыря, высокое кровяное давление. С осторожностью применять животным с гипертрофией предстательной железы, пилородуоденальной обструкцией, контрактурой шейки мочевого пузыря и хроническими обструктивными болезнями легких, если есть проблемы с секрецией слизистой оболочки.
13. При работе с Неотревел[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Неотревел[®]. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует

немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Неотревел® не следует применять самкам в период беременности и вскармливания потомства, щенкам и котятм моложе 16-недельного возраста.

15. Неотревел® применяют животным перорально индивидуально для профилактики тошноты при синдроме укачивания, в дозе 5,0 мг/кг массы животного по действующему веществу за 1-2 часа до поездки:

– одна таблетка массой 125 мг (10 мг дименгидрината) на 2 кг массы животного;

– одна таблетка массой 625 мг (50 мг дименгидрината) на 10 кг массы животного.

Препарат вводят однократно, при необходимости возможно повторное введение препарата на следующий день (но не более двух введений).

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. Наиболее часто наблюдается угнетение ЦНС (вялость, сонливость). Редко нарушения со стороны ЖКТ (диарея, рвота) и со стороны иммунной системы (аллергические реакции). В случае возникновения аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматическую терапию.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, рвота, атаксия. В этих случаях животному назначают энтеросорбенты и средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять препарат одновременно с ототоксическими антибиотиками (стрептомицин, неомидин, биомидин, амикацин, канамицин), так как это может способствовать необратимому нарушению слуха. Сочетание с препаратами висмута, скополамином, обезболивающими средствами повышает вероятность нарушения зрения. Усиливает эффекты атропина, катехоламинов, седативных и снотворных средств, нейролептиков, ослабляет действие кортикостероидов, антикоагулянтов.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. При применении препарата следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков.

21. Препарат Неотревел® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, поселок
---	---

препарата для ветеринарного применения

городского типа Томилино, ул. Гаршина, д. 11/33.

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, поселок городского типа Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»



В.В. Тарабрин