

09.08.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Нитамин

(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов,
ул. им. Осипова В.И., д.1)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-18.12-3022№ПВР-3-2.1/00708

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование: Нитамин (Nitamin);
- международные непатентованные наименования: витамин А, витамин D₃, витамин Е, витамин С.

2. Лекарственная форма - раствор для инъекций и орального применения.

Нитамин в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: ретинола пальмитат (витамин А) 50000 МЕ, холекальциферол (витамин D₃) 5000 МЕ, токоферола ацетат (витамин Е) 50 мг, аскорбиновая кислота (витамина С) 100 мг, а также вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль-660-гидроксистеарат (соллютол HS 15), 1,2-пропандиол, бензиловый спирт, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата Нитамин при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 18 месяцев со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки - 14 суток. Запрещается применение препарата Нитамин по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 10, 20, 50, 100, 250 мл в стеклянные флаконы, по 500 мл в стеклянные бутылки соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками с клипсами контроля первого вскрытия. Флаконы с препаратом объемом 20, 50 и 100 мл допускается упаковывать в индивидуальные пачки из картона. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 4°C до 25°C.

6. Нитамин следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Нитамин отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: витамины и витаминоподобные средства.

10. Нитамином восполняется недостаточность витаминов в организме животных.

Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость против инфекции. Повышенные дозы препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ. Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противораковым действием. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃. Витамин С является важным фактором нормального роста и повышает защитные функции организма.

Введение лекарственного препарата в организм приводит к быстрому возрастанию витаминов в крови и накоплению их в печени и других тканях.

По степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

III. Порядок применения.

11. Нитамином применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нормализации обмена веществ у животных при стрессах, снижении продуктивности и дополнительных нагрузках: во время беременности (только во второй половине) и в период лактации, особенно при нарушениях воспроизводительной функции; при перемещении животных, при замене кормов на откорме, при задержке роста и недостаточном привесе, при инфекционных и инвазионных заболеваниях, при ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках и дегельминтизации; после оперативных вмешательств или ранений, при плохой яйценоскости и пониженной прочности скорлупы яиц.

12. Противопоказанием к применению является гипервитаминоз и сверхчувствительность к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом Нитамином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Любим с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Нитамином. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Применение беременным животным возможно только во второй половине беременности, лактирующим и потомству животных под контролем ветеринарного врача.

15. Лекарственный препарат вводят животным внутримышечно, подкожно один раз в 4-8 недель или орально в смеси с водой для поения или кормом 1 раз в месяц. С лечебной целью дозу увеличивают в 2-3 раза. Цыплятам и курам-молодкам применять однократно, а при разведении кур-несушек – двукратно с интервалом в 2 недели.

Доза препарата зависит от вида животного, возраста и метода введения. Сельскохозяйственной птице препарат вводят орально в смеси с водой для поения. При оральном применении животным препарат задают с кормом или питьевой водой (добавляют воду, а не наоборот, при тщательном перемешивании). Разведение лекарственного препарата необходимо проводить ступенчато.

Рекомендуемые дозы лекарственного препарата с учетом вида животного, возраста и метода введения:

Вид и возраст животного	Метод введения	
	Внутримышечно или подкожно, мл на 10 кг живой массы	Орально, мл на 10 кг живой массы
Крупный рогатый скот, лошади	0,2-0,25	0,3-0,5
Телята, жеребята	0,2-0,5	0,5-0,6
Овцы, козы	0,5-0,8	0,75-1,25
Ягнята	1,5-2,0	2,0-3,0
Свиньи:		
Свиноматки	0,3-0,45	0,5-0,7
Свиньи на откорме	0,2-0,3	0,2-0,5
Поросята	0,4-1,0	1,0-2,0
Собаки, кошки	0,2-0,3	0,3-0,6
Кролики, пушные звери	0,6-1,0	1,0-2,0
Сельскохозяйственная птица:		мл на 1л воды
Цыплята		1,0
Молодки, куры-несушки	-	1,5
Индюшки		2,0

16. При применении в рекомендуемых дозах в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. При повышенной индивидуальной чувствительности у некоторых животных наблюдается возбуждение, саливация, атаксия, учащенная дефекация и мочеиспускание. В этих случаях применение препарата прекращают, вводят антигистаминные препараты, проводят симптоматическую и дезинтоксикационную терапию.

17. При значительной передозировке у животного может наблюдаться: нарушение координации движений, саливация, угнетение. Применяют симптоматические средства и меры, направленные на ускоренное выведение лекарственного препарата из организма.

18. Лекарственный препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение препарата Нитамина с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск проявления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивают риск развития внутричерепной гипертензии. С осторожностью применяют при одновременном назначении с НПВС, сердечными гликозидами – усиливается действие.

19. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

20. В случае пропуска очередной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

21. Продукция от животных при применении препарата может использоваться в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д.1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д.1.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Нитамина, согласованная Россельхознадзором 1 сентября 2017 года.