

31.07.2020

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Пихтоин®

(Организация-разработчик: АО завод «Ветеринарные препараты»,  
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д.2)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-7.12-4101№ПВР-3-1.5/01322

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Пихтоин®.

Международное непатентованное наименование: живица сосновая.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Пихтоин® содержит в 100 г в качестве действующего вещества живицу сосновую - 20 г, а в качестве вспомогательных веществ: воск пчелиный или вошину, мел химически осажденный и масло индустриальное.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную мазь от светло-желтого до коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата Пихтоин® при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.

4. Пихтоин® выпускают расфасованным по 15; 40; 140; 500 г в банки полимерные с крышкой с контролем первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Пихтоин® хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С.

6. Пихтоин® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: дерматотропные средства.

10. Пихтоин® оказывает комплексное противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие.

Живица сосновая, входящая в состав Пихтоина, за счет наличия флавоноидов и фитонцидов обеспечивает антисептические свойства препарата.



При нанесении на кожу Пихтоин<sup>®</sup> проникает через сальные железы и частично межклеточные ходы. В железах и межклеточных ходах биологически активные компоненты живицы переходят в растворимое состояние и постепенно всасываются, способствуя расширению сосудов, улучшению кровоснабжения и ускорению рассасывания продуктов воспаления.

Пихтоин<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

11. Пихтоин<sup>®</sup> применяют для лечения незначительных ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, маститов, ушибов, папиллом и язв у животных.

12. Противопоказаний к применению Пихтоина не установлено, за исключением индивидуальной повышенной чувствительности животных к компонентам лекарственного препарата.

13. При работе с Пихтоином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пихтоином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. Перед применением мази с пораженных мест удаляют механические загрязнения, при необходимости выстригают шерсть.

Пихтоин<sup>®</sup> применяют местно, в виде аппликаций, нанося тонким ровным слоем на чистую белую ткань или марлевую салфетку, которой покрывают пораженный участок кожи, затем салфетку с мазью укрепляют бинтом или специальным клеем. Обработку проводят 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

Пихтоин<sup>®</sup> можно наносить непосредственно на пораженный участок, слегка втирая его в окружающие этот участок ткани.

При ушибах и маститах Пихтоин<sup>®</sup> накладывают в форме согревающих повязок. При повторной обработке Пихтоином, ранее нанесенную мазь следует удалить с поверхности обрабатываемого участка стерильной марлей.

Для предотвращения слизывания мази мелким животным надевают шейный воротник.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Пихтоина в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.



При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой. Дополнительного лечения не требуется.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Пихтоин® не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами наружного применения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной или нескольких обработок лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее согласно инструкции, далее интервал между обработками не изменяется.

21. Продукты животноводства вовремя и после применения Пихтоина используют без ограничений.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

АО завод «Ветеринарные препараты»,  
601508, Владимирская область, г.  
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,  
д. 2

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя

АО завод «Ветеринарные препараты»,  
601508, Владимирская область, г.  
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,  
д. 2

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по ветеринарному применению лекарственного препарата Пихтоин®, согласованная Россельхознадзором 05 апреля 2019 г.