



20 СЕН 2022

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора **К.А. САВЕНКОВ**

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению Вакцины ПОЛИВАК-ТМ

(организация-разработчик – ООО «Ветбioxим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16)

Номер регистрационного удостоверения: 77-1-5.12-2946 №ПВР-1-2.1/00766

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – Вакцина ПОЛИВАК-ТМ

Международное непатентованное наименование – Вакцина против дерматомикозов животных

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций (инактивированная вакцина). Вакцина ПОЛИВАК-ТМ изготовлена из инактивированных формалином производственных штаммов грибов рода *Trichophyton* (*Tr. mentagrophytes*, *Tr. equinum*, *Tr. verrucosum*, *Tr.sarkisovii*) и рода *Microsporum* (*M.canis*, *M. gypseum*, *M. canis var. obesum*, *M. canis var. distortum*).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой взвесь микроконидий, цвет которой после взбалтывания может варьировать от светло-серого до желтовато-серого и/или желтовато-коричневого. При хранении допускается образование осадка. Перед применением вакцину следует тщательно взбалтывать.

Срок годности вакцины – 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в течение 15 мин после вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 0,5 мл – для лошадей, 0,6 мл – для собак, 1 мл – для кошек, в стеклянные флаконы вместимостью 3 мл. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы по 10 шт. в пластиковые коробки или блистеры. В каждую коробку вложена инструкция по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °C.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной, подвергшиеся замораживанию, без этикеток, с нарушенной укупоркой и целостностью, измененным цветом вакцины, содержащие посторонние примеси или не разбивающийся при взбалтывании осадок, а также вакцину, не использованную в течение 15 мин после вскрытия флакона, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 30 мин с последующей утилизацией. Утилизация обезвреженного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Вакцина ПОЛИВАК-ТМ – вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у животных к возбудителям дерматомикозов через 20-30 суток после второго введения вакцины. Продолжительность иммунитета не менее 12 месяцев.

В 1 мл вакцины содержится не менее 20 млн. микроконидий штаммов грибов рода *Trichophyton* (*Tr. mentagrophytes*, *Tr. equinum*, *Tr. verrucosum*, *Tr.sarkisovii*) и рода *Microsporum* (*M.canis*, *M. gypseum*, *M. canis var. obesum*, *M. canis var. distortum*).

Вакцина безвредна, обладает терапевтическими свойствами, которые выражаются в ускорении процесса выздоровления и восстановлении шерстного (или кожного) покрова у больных дерматомикозом животных.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики и терапии дерматомикозов собак, кошек и лошадей.

12. Вакцинации не подлежат клинически больные и подозрительные по заболеванием другой этиологии животные, а также животные с повышенной температурой тела, ослабленные и истощенные.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение.

14. Вакцинации не подлежат животные в последний месяц беременности и в первую неделю после родов, а также новорожденные в возрасте до 1-го (собаки, кошки) и до 3-х (лошади) месяцев (см. таблицу).

15. Перед применением в холодное время года вакцину подогревают до температуры (36-38)°С, тщательно взбалтывают до образования однородной гомогенной взвеси, набирают в шприц, не допуская образования пузырьков воздуха.

Вакцину вводят внутримышечно в область бедра, лошадям в среднюю треть шеи двукратно с интервалом между введениями 10-14 суток.

Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу.

С профилактической и лечебной целью вакцину применяют в следующих дозах:

Животные	Возраст животных	Доза (мл)	
		Профилактическая	Лечебная
Собаки	1-10 мес.	0,3	0,5
	старше 10 мес.	0,3	0,6

Животные	Возраст животных	Доза (мл)	
		Профилактическая	Лечебная
Кошки	1-5 мес.	1,0	1,5
	старше 5 мес.	1,5	2,0

Животные	Возраст животных	Доза (мл)	
		Профилактическая	Лечебная
Лошади	3-12 мес.	0,5	0,5
	старше 12 мес.	0,5	0,5

При применении вакцины с терапевтической целью используют двух и трехкратное введение вакцины с интервалом 10-14 суток. Для ускорения отторжения дерматомикозных корочек пораженные участки рекомендуется обрабатывать размягчающими средствами – рыбьим жиром, ланолином, вазелином и другими минеральными или растительными маслами, используемыми в медицине и ветеринарии.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. У отдельных особей отмечается небольшой

отек и воспаление на месте введения вакцины, который самопроизвольно исчезает без лечебного вмешательства спустя 3-4 суток.

При вакцинации животных, находящихся в инкубационном периоде заболевания, вакцинация ускоряет проявление клинической картины дерматомикоза с возникновением множественных поверхностных очагов. Животным, проявившим клинические признаки заболевания, необходимо вводить терапевтическую дозу вакцины. Интервал между введениями вакцины 10-14 суток.

Учитывая, что введение вакцины животным, находящимся в инкубационном периоде болезни, ускоряет клиническое проявление дерматомикозов, необходимо в неблагополучных по дерматомикозам питомниках и других предприятиях проводить поголовную вакцинацию в терапевтических дозах. У животных, имеющих нарушение обмена веществ и пораженных эктопаразитами, эффективность применения вакцины снижается.

17. Симптомов дерматомикозов или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

18. Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и фармакологическими лекарственными средствами.

19. Особеностей постvakцинальной реакции при первичной, повторной вакцинации и ревакцинации не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики дерматомикозов.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины ПОЛИВАК-ТМ не устанавливаются.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины ПОЛИВАК-ТМ: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Генеральный директор ООО «Ветбиохим»

А.В. Кривонос

