

26.10.2022

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Раствор йода спиртовой 5 %

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс»,
610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.)

Номер регистрационного удостоверения:
24-3 -16.12-1009№ПВР-3 -3.9/00211

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Раствор йода спиртовой 5 % (Solutio Iodi spirituosa 5 %).

Международное непатентованное наименование: йод.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Раствор йода спиртовой 5 % в 100 мл содержит в качестве действующего вещества 5 г йода, а в качестве вспомогательных веществ калия йодид, спирт этиловый и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом йода.

Срок годности Раствора йода спиртового 5 % в закрытой упаковке организации-производителя при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства.

Запрещается применять Раствор йода спиртовой 5 % после окончания срока годности.

4. Выпускают Раствор йода спиртовой 5 % расфасованным по 50, 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных полимерными пробками и закрытых полимерными навинчиваемыми крышками или укупоренных крышками укупорочно-навинчиваемыми.

Каждую единицу фасовки сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 25 °С.

6. Раствор йода спиртовой 5 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Раствор йода спиртовой 5 % относится к фармакотерапевтической группе: антисептики и дезинфицирующие средства.

10. Раствор йода спиртовой 5 % обладает антимикробным, раздражающим, отвлекающим действием, ускоряет заживление ран.

По степени воздействия на организм Раствор йода спиртовой 5 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Раствор йода спиртовой 5 % применяют наружно:

- для обработки операционного поля, места инъекций, а также пальцев рук хирурга;
- при свежих ранах, травмах, фурункулезе, свищах;
- как раздражающее и отвлекающее средство при хронических воспалениях суставов, сухожилий, мышц.

12. Противопоказанием к применению Раствора йода спиртового 5 % является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При применении Раствора йода спиртового 5 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Раствором йода спиртовым 5 %.

При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует немедленно промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения Раствора йода спиртового 5 % самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. При наружном применении лекарственным препаратом смазывают поверхность кожи, при наличии ран смазывают кожу у краев ран, не нанося на раневую поверхность. Для отвлекающего действия Раствор йода спиртовой 5 % наносят на кожу в виде сетки.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Раствора йода спиртового 5 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков раздражения кожи (покраснение кожи, зуд), обработку прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты.

17. Симптомы передозировки у животных при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Раствор йода спиртовой 5 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной или нескольких обработок лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее согласно инструкции, далее интервал между обработками не изменяется.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных во время и после применения Раствора йода спиртового 5 % в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителей

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Генеральный директор
ЗАО «НПП «Фармакс»

И.В. Раджапова