

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

10.07.2020

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению
лекарственного препарата Раствор йода спиртовой 5 %

(Организация-разработчик: ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д.4-Б)

Номер регистрационного удостоверения 12-3-7.15-2815№ПВР-3-3.9/00211

1. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Раствор йода спиртовой 5 % (Solutio Iodi spirituosа 5 %).
Международное непатентованное наименование: йод.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Раствор йода спиртовой 5 % в 100 мл в качестве действующего вещества содержит йод - 5 г, а в качестве вспомогательных веществ – калий йодистый, спирт этиловый ректификованный, воду очищенную.

3. По внешнему виду Раствор йода спиртовой 5 % представляет собой прозрачную жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства.

Запрещается использовать Раствор йода спиртовой 5 % по истечении срока годности.

4. Раствор йода спиртовой 5 % выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из оранжевого стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, герметично укрепленными алюминиевыми колпачками.

Каждая потребительская упаковка лекарственного препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Раствор йода спиртовой 5 % хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Раствор йода спиртовой 5 % следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Раствор йода спиртовой 5 % относится к фармакотерапевтической группе антисептиков и дезинфицирующих средств.

10. Раствор йода спиртовой 5 % обладает антимикробным, раздражающим, отвлекающим действием, ускоряет заживление ран.

При нанесении на кожу из препарата медленно и равномерно высвобождается активный йод, который окисляет аминокислоты ферментов и трансмембранные белки патогенных микроорганизмов.

По степени воздействия на организм Раствор йода спиртовой 5 % относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Раствор йода спиртовой 5 % применяют у крупного и мелкого рогатого скота, свиней и собак:

- для обработки операционного поля, места инъекции;
- при свежих ранах, травмах, фурункулезе, свищах;
- как раздражающее и отвлекающее средство при хронических воспалениях суставов, сухожилий, мышц;
- а также для обработки пальцев рук хирурга.

12. Противопоказанием для применения Раствора йода спиртового 5 % является индивидуальная повышенная чувствительность животного к йодсодержащим лекарственным препаратам.

13. При работе с Раствором йода спиртовым 5 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Раствором йода спиртовым 5 %. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Раствор йода спиртовой 5 % применяется с осторожностью в первой половине беременности.

15. Раствор йода спиртовой 5 % применяют наружно. При обработке ран участки кожи смазывают по краям раны марлевыми тампонами, смоченными в Растворе йода спиртовом 5 %, не нанося его непосредственно на рану. Обработки

проводят дважды в сутки до выздоровления, но не более 7 суток. Обработку операционного поля производят дважды, в начале и в конце операции. Кожу в местах инъекций дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в Растворе йода спиртовом 5 %. Для отвлекающего действия препарат наносят на кожу в виде сетки.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций, использование лекарственного препарата прекращают.

17. Симптомы передозировки препарата не установлены.

18. Раствор йода спиртовой 5 % можно назначать в сочетании с другими лекарственными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной или нескольких обработок лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее согласно инструкции.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Раствора йода спиртового 5 %, используют без ограничений.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения

ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя

ООО «Торговый дом «БиАгро»,
Россия, 600014, Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б