

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Рыбьего жира
для улучшения обмена веществ у свиней, кошек и собак

(организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. Общие сведения

1 Рыбий жир (*Oleum jecoris*) — кормовая добавка для улучшения обмена веществ у свиней, кошек и собак.

2 Кормовая добавка содержит жир рыб и морских млекопитающих, богатый ненасыщенными жирными кислотами.

В 1 мл добавки содержится не менее 10 МЕ витамина А.

Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3 По внешнему виду добавка представляет собой маслянистую жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого, от оранжевого до темно-красного цвета с характерным запахом.

4 Выпускают Рыбий жир в форме раствора, расфасованного по 30, 50, 100, 150, 200 мл в стеклянные и полимерные флаконы; 0,33; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 10; 20; 50 л в полимерные флаконы и канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; наименования добавки; состава; гарантируемых показателей; способа применения; надписи «Для животных»; номера партии; даты производства (месяц, год); срока хранения; условий хранения; объема в единице фасовки; регистрационного номера; обозначения стандарта организации; информации о подтверждении соответствия и сопровождают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5° С до 25° С.

Срок хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается использовать кормовую добавку по окончании срока хранения.

II. Биологические свойства

5 Биологические свойства кормовой добавки обусловлены наличием ненасыщенных жирных кислот и витамина А.

6 Применение кормовой добавки способствует нормализации обмена веществ, благоприятно влияет на рост и развитие свиней, кошек и собак. Кормовая добавка используется как общеукрепляющее средство.

III. Порядок применения

- 7 Рыбий жир применяют для улучшения обмена веществ у свиней, кошек и собак.
- 8 Кормовую добавку назначают ежедневно в течение всего периода кормления: свиньям по 0,1-0,3 мл/кг живой массы; собакам и кошкам — 0,5-1,0 мл/кг живой массы.
- 9 В рекомендуемых дозах кормовая добавка не вызывает у животных побочных явлений и осложнений.
- 10 Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками. Совместное использование кормовой добавки с витаминными лекарственными препаратами и кормовыми добавками требует консультации с ветеринарным специалистом.
- 11 Противопоказаний по применению не установлено.
- 12 Рыбий жир не применяют продуктивным животным в течение 7 дней до убоя, так как он придаёт продукции запах рыбы.

IV. Меры личной профилактики

- 13 При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
- 14 Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров.

(Адрес организации-производителя: 610033, г.Киров, ул. Солнечная, д. 7)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-2-13.16/03314