

20 ОКТ 2023

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Санофлай®

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-23.23-5044/ПВР-3-23.23/03862

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Санофлай® (Sanofly);
международное непатентованное наименование: цифлутрин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Санофлай® в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 10 мг цифлутрина, а также вспомогательные вещества: сольвент с высоким содержанием ароматических веществ, октилдодеканол, масло вазелиновое.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком до светло-желтого цвета с коричневым оттенком. Допускается выпадение мелкодисперсного осадка.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона – 60 суток.
Запрещается применение препарата Санофлай® по истечении срока годности.
4. Санофлай® выпускают расфасованным по 10 мл во флаконы-капельницы полимерные, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми, по 100 мл во флаконы полимерные с крышками навинчиваемыми, по 500 мл и 1 л во флаконы полимерные с двумя горловинами и дозирующим устройством, укупоренные колпачками винтовыми. Каждый флакон оклеивают этикетками самоклеящимися. Флаконы по 10 мл упаковывают поштучно в пачки из картона. Допускается упаковка флаконов объемом 10 мл по 11 штук в пачку из картона, оклеенную этикеткой самоклеящейся с контролем первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 8 °С до 25 °С.
6. Санофлай® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Санофлай® относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам из группы синтетических пиретроидов.

10. Санофлай® обладает контактным инсектоакарицидным и репеллентным действиями в отношении двукрылых насекомых: зоофильных мух, включая *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae), мошек (Simuliidae).

Действующим веществом препарата является цифлутрин, который относится к группе синтетических пиретроидов, механизм действия которых заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых.

После нанесения на кожу препарат распределяется по поверхности тела, в незначительной степени резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсектоакарицидное и репеллентное действие.

Санофлай® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемой дозе препарат не оказывает резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного, иммунотоксического и местнораздражающего действия на кожу. При попадании на слизистые оболочки глаз вызывает слабое раздражение.

III. Порядок применения

11. Санофлай® применяют для обработки крупного и мелкого рогатого скота в пастбищный период, лошадей в период активного лета насекомых, в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров, мошек и защиты животных от их нападения.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата могут наблюдаться угнетение, повышенная возбудимость, гиперемия и болезненность в месте обработки.

Санофлай® не следует применять истощенным и больным инфекционными болезнями животным, а также наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.

13. При работе с препаратом Санофлай® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Обработку животных следует проводить в спецодежде (халат, головной убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки). Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Санофлай®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не следует применять препарат самкам в первой половине беременности. Применение препарата самкам в период беременности возможно после консультации с ветеринарным врачом.

15. Крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям массой менее 300 кг Санофлай® наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного. Крупному рогатому скоту и лошадям массой более 300 кг Санофлай® наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 10 мл на животное. Обработку животных проводят в пастбищный период, желательно в вечернее время суток, один раз в 4-6 недель, в зависимости от численности насекомых. Дойных животных следует обрабатывать сразу после вечерней дойки.

Защитное действие препарата продолжается не менее 28 дней после однократной обработки.

Перед массовой обработкой поголовья каждую серию препарата Санофлай® следует испытать на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение суток приступают к обработке всего поголовья.

16. При применении препарата Санофлай® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций препарат прекращают, смывают водой с мылом и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у животных могут наблюдаться угнетенное состояние и гиперсаливация. При локализованном применении препарата возможны ожоги.

18. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: не рекомендуется применение препарата с другими синтетическими пиретроидами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено. При первом применении в редких случаях возможна гиперсаливация, проходящая самостоятельно без применения лекарственных средств.

20. При проведении обработок следует придерживаться рекомендуемого инструкцией интервала. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животного происхождения после применения препарата Санофлай® в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Апиценна», 143985,
Московская область, г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Апиценна», 143985,
Московская область, г. Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4.
+ 7 (495) 580-77-13,
www.apicenna.ru, info@apicenna.ru.

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН»



А.А. Смирнов