

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата СексКонтроль спот-он

(организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: СексКонтроль спот-он (SexControl spot-on).

Международное непатентованное наименование: мегестрол, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Препарат содержит в качестве действующих веществ (ДВ) мегестрола ацетат – 2,5% и этинилэстрадиол – 0,02%, в качестве вспомогательных веществ ментол, витамин Е и диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (ДЭМЭ).

3. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую бесцветную жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. После вскрытия флакона препарат хранить не более 6 месяцев в прохладном месте. Препарат по истечении срока годности не должен применяться.

4. Выпускают СексКонтроль спот-он расфасованным по 3 мл в стеклянные или полимерные флаконы-капельницы с навинчиваемыми крышками контроля первого вскрытия, упакованные поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°C до 30°C.

6. СексКонтроль спот-он следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: гормоны и антагонисты.

10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя

секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению. У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Эстроген этинилэстрадиол вступает во взаимодействие в клетках-мишенях со специальными эстрогеновыми рецепторами. У самок в комплексе с мегестрола ацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У самцов подавляет секрецию андрогенов и угнетает сперматогенез.

Входящие в состав препарата мегестрола ацетат и этинилэстрадиол, благодаря вспомогательным компонентам, легко проникают через кожу животного и попадают в системный кровоток, в результате чего гормоны мегестрола ацетат и этинилэстрадиол достигают и действуют на гипоталамо-гипофизарную систему и эстрогеновые рецепторы.

СексКонтроль спот-он по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

11. СексКонтроль спот-он назначают кошкам для регуляции половой охоты:

- самкам (кошкам) для задержки и прерывания течки;
- самцам (котам) для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Противопоказано применение препарата при заболеваниях мочеполовой системы, опухолях, сахарном диабете, неполовозрелым, беременным и лактирующим животным.

13. СексКонтроль спот-он наносят животным на кожу точечно в область затылка. Доза зависит от цели применения препарата, пола и массы животного:

Показания	Начало применения	Доза	Курс применения
Кошки			
Задержка течки	В период между течками	2 капли на животное массой до 5 кг	1 раз в неделю, но не более 18 мес. подряд
		4 капли на животное массой 5 - 10 кг	
Повторение курса возможно после проявления у кошки			

	нормального полового цикла.		
Прерывание течки	Первые признаки течки, но не позже 2-х дней от начала	4 капли на животное массой до 5 кг	1 раз в сутки в течение 4-7 дней (до исчезновения признаков течки плюс 1 день)
		8 капель на животное массой 5 - 10 кг	
Коты			
Снижение полового возбуждения и коррекция поведения	При появлении первых признаков	4 капли на животное массой до 5 кг	1 раз в сутки в течение 7 дней
		8 капель на животное массой 5 - 10 кг	
		Продолжить:	
		2 капли на животное массой до 5 кг	1 раз в сутки в течение 14 дней
		4 капли на животное массой 5 - 10 кг	

14. Симптомов, возникающих при передозировке СексКонтроль спот-он, не установлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

16. Запрещается применение СексКонтроль спот-он неполовозрелым, беременным и лактирующим животным.

17. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении СексКонтроль спот-он в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При длительном применении или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствует.

20. СексКонтроль спот-он не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом СексКонтроль спот-он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует гладить животное и подпускать к маленьким детям в течение 14 суток после обработки.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом СексКонтроль спот-он. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование производственной производителя препарата	и площадки лекарственного	адрес ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
--	---	---

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
--	--

Номер регистрационного удостоверения _____