

23.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Линимент синтомицина 1%, 5%, 10%

(Организация-разработчик: АО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д.2)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-9.16-4138№ПВР-3-1.9/00164

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% (Linimentum Synthomycini 1%, 5%, 10%).

Международное непатентованное наименование: хлорамфеникол.

2. Лекарственная форма: линимент для наружного применения.

Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% содержит в 100 г в качестве действующего вещества соответственно 1 г или 5 г, или 10 г синтомицина, а в качестве вспомогательных веществ: масло касторовое, натрий – карбоксиметилцеллюлозу (или бланозе), эмульгатор, сорбиновую кислоту и воду дистиллированную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую однородную массу белого или слегка желтоватого цвета со слабым своеобразным запахом. Срок годности Линимента синтомицина 1%, 5%, 10% при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.

4. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% выпускают расфасованным по 18; 140; 400 г в банки полимерные с крышкой с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка снабжена инструкцией по применению.

5. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0⁰С до 25⁰С.

6. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: амфениколы.

10. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% обладает антибактериальным, противовоспалительным действием, ускоряет процесс заживления ран.

Хлорамфеникол (синтомицин) – бактериостатический антибиотик, нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке. Активен в отношении большинства штаммов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, устойчивых к пенициллину, тетрациклам, сульфаниламидам.

Масло касторовое, входящее в состав препарата, оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие.

По степени воздействия на организм Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% применяют животным для лечения гнойных ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, язв, ожогов, трещин сосков вымени.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение Линимента синтомицина 1%, 5%, 10% продуктивным животным.

13. При работе с Линиментом синтомицина 1%, 5%, 10% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Линиментом синтомицина 1%, 5%, 10%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Противопоказаний и особенностей применения препарата беременным животным, животным в период лактации, потомству животных не установлено.

15. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% применяют наружно, нанося его тонким слоем непосредственно на поврежденную поверхность, или намазывают на стерильную марлевую салфетку и фиксируют на ране 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от тяжести поражения. При необходимости предварительно проводят туалет раны.

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Линимента синтомицина 1%, 5%, 10% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают, линимент снимают марлевым тампоном с поверхности кожи, при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами наружного применения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

21. Линимент синтомицина 1%, 5%, 10% не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

АО завод «Ветеринарные препараты»,
601508, Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,
д. 2

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

АО завод «Ветеринарные препараты»,
601508, Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,
д. 2

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по ветеринарному применению лекарственного препарата Линимент синтомицина 1%, 5%, 10%, согласованная Россельхознадзором 13 сентября 2019 г.