Согласовано
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____

06.08.2025

# ИНСТРУКЦИЯ
## по ветеринарному применению лекарственного препарата Стоп-интим® капли

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,
119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-11.18-4263№ПВР-3-4.6/01691

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Стоп-интим® капли (Stop-intim drops);
международное непатентованное наименование: мегестрол.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Препарат Стоп-интим® капли в качестве действующего вещества содержит мегестрола ацетат – 20 мг/мл и вспомогательные вещества: полисорбат-80, поливинилпирролидон, Na-карбоксиметилцеллюлозу, глицерин и полиэтиленгликоль-400.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию белого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 2; 2,5 мл в полимерных флаконах-капельницах в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками-капельницами. Каждый флакон с препаратом помещают в пачку из картона в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Стоп-интим® капли следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

### II. Фармакологические свойства

9. Препарат Стоп-интим® капли относится к гормональным лекарственным средствам группы эстрогенов и гестагенов.

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена и обладает свойством ингибировать секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом, при недостаточном количестве ЛГ, процесс овуляции становится невозможным.

При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 48 часов.

Стоп-интим® капли по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

## III. Порядок применения

11. Стоп-интим® капли назначают самкам для задержки и прерывания течки; самцам – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Противопоказанием к применению препарата Стоп-интим® капли является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет. Не следует применять препарат неполовозрелым животным.

13. При работе с препаратом Стоп-интим® капли следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Стоп-интим® капли. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Не допускается применение Стоп-интим® капель самкам в период беременности и вскармливания потомства.

15. Стоп-интим® капли вводят перорально за 1 – 2 часа до кормления, капая с помощью капельницы на корень языка или на кусочек лакомства. Перед применением суспензию во флаконе следует тщательно взболтать в течение 1 – 2 минут.

Доза препарата зависит от пола, массы животного и цели его применения.

Кошкам применяют препарат Стоп-интим® капли:

– с целью задержки течки – в период между течками один раз в неделю в дозе 4 капли на животное. Курс применения препарата – не более 18 месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

– с целью прерывания течки – при появлении первых признаков течки (но не позднее чем через 3 дня от ее начала) 5 – 7 раз с интервалом 24 часа в дозе 9 капель на животное.

В течение года следует проводить не более двух курсов применения лекарственного препарата.

Котам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в следующих суточных дозах – по 8 капель на животное.

Первые 7 дней лекарственный препарат применяют в суточной дозе, последующие 14 дней по ½ от суточной дозы.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У некоторых животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочных желез. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-интим® капель с кортикостероидами. Информация об особенностях взаимодействия с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

19. При первом применении лекарственного препарата у животного могут наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска приема применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат Стоп-интим® капли не предназначен для применения продуктивным животным.

| | |
|---|---|
| Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. | ООО «Апиценна», 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4. |
| Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. | ООО «Апиценна», 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.<br>+ 7 (495) 580-77-13,<br>www.apicenna.ru, info@apicenna.ru. |

Заместитель генерального директора
ООО «АПИ-САН» А.А. Смирнов