

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-цистит[®] Плюс для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак

(организация-производитель: ООО «Апиценна», г. Москва, Россия)

I. Общие сведения

1. Стоп-цистит[®] Плюс (Stop-cistit plus) – кормовая добавка для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

2. Стоп-цистит[®] Плюс выпускают в форме жевательных таблеток, в двух модификациях: Стоп-цистит[®] Плюс для кошек с массой таблетки 500 мг и Стоп-цистит[®] Плюс для собак с массой таблетки 1000 мг.

Стоп-цистит[®] Плюс для кошек в 1 таблетке содержит: метионин 90 – 110 мг, L-теанин 22,5 – 27,5 мг, триптофан 4,5 – 5,5 мг, экстракт клюквы сухой 22,5 – 27,5 мг, экстракт брусники листа сухой 22,5 – 27,5 мг, автолизат пивных дрожжей 9 – 11 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу 54 – 66 мг, усилитель вкуса C'SENS 9P 45 – 55 мг, коповидон 27 – 33 мг, кросповидон 18 – 22 мг, ароматизатор «Печень» 4,5 – 5,5 мг, кальция стеарат 2,25 – 2,75 мг, тальк 2,25 – 2,75 мг и целлюлозу микрокристаллическую 126 – 154 мг.

Стоп-цистит[®] Плюс для собак в 1 таблетке содержит: метионин 180 – 220 мг, L-теанин 45 – 55 мг, триптофан 9 – 11 мг, экстракт клюквы сухой 45 – 55 мг, экстракт брусники листа сухой 45 – 55 мг, автолизат пивных дрожжей 18 – 22 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу 108 – 132 мг, усилитель вкуса C'SENS 9P 90 – 110 мг, коповидон 54 – 66 мг, кросповидон 36 – 44 мг, ароматизатор «Печень» 9 – 11 мг, кальция стеарат 4,5 – 5,5 мг, тальк 4,5 – 5,5 мг и целлюлозу микрокристаллическую 252 – 308 мг.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой таблетки светло-коричневого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и крестообразной риской.

4. Стоп-цистит[®] Плюс выпускают расфасованным: по 30 или 40 таблеток в полимерных банках с крышками, с контролем первого вскрытия или по 10 таблеток в блистерах.

В картонные пачки упаковывают: полимерные банки поштучно, блистеры по 3 или 4 штуки. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

Каждую банку или блистер маркируют с указанием: наименования организации-производителя; наименования и назначения добавки; состава; формы выпуска; количества таблеток, шт.; номера серии; срока и условий хранения; даты производства; надписи: «Для животных».

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; наименования, назначения и способа применения добавки; состава; количества таблеток, шт.; гарантируемых показателей; формы выпуска; номера серии; регистрационного номера; срока и условий хранения; даты производства; знака соответствия; обозначения настоящего стандарта; штрихового кода; надписей: «Для животных», «Не является лекарственным средством!», «Хранить в местах, недоступных для детей!», «Не применять по истечении срока хранения!», «Перед применением ознакомиться с инструкцией!».

Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 65%.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Стоп-цистит® Плюс не должна применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Кормовая добавка Стоп-цистит® Плюс, благодаря комплексу растительных экстрактов и незаменимых аминокислот оказывает положительное регулирующее влияние на обменные процессы, способствует более быстрому восстановлению и повышению продолжительности периода ремиссии при заболеваниях мочевыводящих путей, в том числе у животных, имеющих в анамнезе склонность к развитию частых сезонных рецидивов. При комплексной терапии заболеваний мочевыделительной системы кормовая добавка снижает вероятность образования мочевых конкрементов, L-теанин и триптофан снижают проявление тревожности, способствуя расслаблению животного и восстановлению физиологического диуреза. Метионин способен смещать водородный показатель мочи в кислую сторону, снижая вероятность образования камней струвитного типа. Экстракты клюквы и брусники обладают противовоспалительным действием. Автолизат дрожжей является источником биологически-активных веществ, необходимых для обогащения рациона животных и для полноценной жизнедеятельности организма.

III. Порядок применения

6. Стоп-цистит® Плюс применяют кошкам и собакам для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы, в том числе для снижения вероятности развития возможных сезонных рецидивов заболеваний мочевыводящих путей, а также в комплексе с лекарственными препаратами при урологическом синдроме, мочекаменной болезни, идиопатическом цистите, бактериальных инфекциях мочевыводящих путей, а также в послеоперационном периоде после удаления мочевых камней.

7. Кормовую добавку животным вводят перорально индивидуально с кормом или дают как лакомство в течение 15 – 30 дней. Стоп-цистит® Плюс для кошек по 1 таблетке на 4 кг массы тела животного 2 раза в день. Стоп-цистит® Плюс для собак по 1 таблетке на 10 кг массы тела животного 2 раза в день.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и

появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

9. Кормовая добавка Стоп-цистит[®] Плюс совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний для применения кормовой добавки не выявлено.

11. Кормовая добавка Стоп-цистит[®] Плюс не предназначена для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовой добавкой Стоп-цистит[®] Плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Хранить в местах, недоступных для детей.

13. При случайном контакте кормовой добавки Стоп-цистит[®] Плюс с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с кормовой добавкой Стоп-цистит[®] Плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению кормовой добавки или этикетку).

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, строение 1А, кв. 74

Наименование и адрес организации-производителя: ООО «Апиценна»,

Юридический адрес: 105066, Москва г, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 5, этаж цоколь, ком.2, пом. I.

Фактический адрес места производства: 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВР-2-39 20 1035-88