

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп – зуд[®] спрея для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи и отитов у собак и кошек
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп – зуд[®] спрей (Stop-itch spray).

Международное непатентованное наименование: триамцинолон, хлорамфеникол, метронидазол, лидокаин, экстракт календулы.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Стоп – зуд[®] спрей в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: триамцинолон - 0,5 мг, хлорамфеникол - 5 мг, метронидазол - 10 мг, лидокаина гидрохлорид - 50 мг, экстракт календулы - 4 мг, а также вспомогательные вещества: спирт изопропиловый, диметилсульфоксид, диметилформамид и полиэтиленгликоль - 400.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость желто-коричневого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применять Стоп – зуд[®] спрей по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат по 30 мл в полимерных флаконах с распылителем, упакованных поштучно в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Стоп – зуд[®] спрей следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Стоп – зуд[®] спрей относится к комбинированным противовоспалительным лекарственным препаратам.

10. Входящий в состав препарата триамцинолон является синтетическим глюкокортикоидом, обладает выраженным противовоспалительным, противоаллергическим и десенсибилизирующим действием. Механизм его действия заключается в блокировании высвобождения эозинофилами медиаторов воспаления, в том числе простагландинов, потенцирующих воспалительный процесс, уменьшении количества тучных клеток, вырабатывающих

гиалуроновую кислоту, снижении проницаемости капилляров.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, способствует снятию зуда. Хлорамфеникол и метронидазол оказывают действие на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий. Экстракт календулы обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, ускоряет регенерацию тканей и заживление ран.

Стоп – зуд[®] спрей по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Стоп – зуд[®] спрей применяют собакам и кошкам для лечения острых, хронических дерматитов (атопический дерматит, экземы, диффузный нейродермит, расчесы, алопеции, инфицированные дерматиты, реакции на укусы насекомых) и отитов аллергической или бактериальной этиологии.

12. Противопоказанием для применения Стоп – зуд[®] спрея является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе), вирусные заболевания и диабет.

13. Держа флакон вертикально, и нажимая на распылительную головку, направляют распылитель на пораженную поверхность с расстояния 10-15 см.

При лечении дерматитов на пораженные поверхности после их предварительной санитарной обработки наносят Стоп – зуд[®] спрей, распыляя тонким слоем два раза в день в течение 5-10 дней.

При лечении отита наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок и, направляя распылитель на внутреннюю поверхность ушной раковины, равномерно увлажняют поверхность. После этого складывают ушную раковину вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку проводят 2-3 раза в день в течение 5-7 дней. Курс лечения может быть продолжен по усмотрению лечащего ветеринарного врача.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Не рекомендуется применять препарат беременным и лактирующим самкам, а также щенкам и котятам до 8 - ми недельного возраста.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной или нескольких обработок применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, возможно угнетение, слюнотечение, расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применение препарата прекращают и при необходимости назначают симптоматические средства.

19. Стоп – зуд[®] спрей не рекомендуется применять одновременно с другими препаратами для местного применения, содержащими кортикостероидные гормоны.

20. Стоп – зуд[®] спрей не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе со Стоп – зуд[®] спреем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп – зуд[®] спреем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп - зуд спрея, утвержденная Россельхознадзором 12 июля 2013 г.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-13.13-2868 № ПВР-3-1.8/02093